

*Standaard*

# Edelparkieten.

**Deel 2, Rozeborstbaardparkiet,  
Grote Alexanderparkiet,  
Rozekopparkiet,  
Pruimkopparkiet,  
Grijskopedelparkiet,  
Layardparkiet,  
Malakkaparkiet,  
Derbyanparkiet en de  
Duif of Malabarparkiet**

**Inhoudsopgave.**

	Inhoud	2
1	Voorwoord	3
2	Algemeen	4
2a	Het geslacht Edelparkieten, genus Psittacula	4
2b	Niet opgenomen in de standaard	5
2c	Uitgestroven soorten	5
3	Veerstructuur en mutaties	6
3a	Veerstructuur van de Edelparkieten	6
3b	De mutaties bij de Edelparkieten	6
3c	Toelichting bij de benamingen	9
3d	De vererving bij de Edelparkieten	10
4	De standaard Edelparkieten	11
4a	Afrikaanse halsbandparkiet	11
4b	Rozeborst baardparkiet	14
4c	Alexander parkiet	21
4d	Rozekop parkiet, Grijskop parkiet, Pruimkop parkiet en Rothschild's parkiet	27
4e	Malabar- en Layard's parkiet	33
4f	Langstaart- en Derbyan parkiet.	36

## 1: Voorwoord.

Vertegenwoordigers van het geslacht Edelparkieten behoren tot de langst bekende vogels in avicultuur. De Grote Alexanderparkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die enkele van deze vogels meebracht van zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de bekendste en meest gekweekte parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe mutaties ontstaan. Veel van deze mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvarianties bijna eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei soms fantasievolle benamingen gekregen.

In 2000 heeft het KMV-bestuur een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een standaard halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de binnen PS-Holland functionerende Werkgroep Edelparkieten, bestaande uit diverse bekende kwekers uit Nederland en België. Deze groep heeft als doel het promoten van de edelparkieten als volierevogel en het verschaffen van informatie daarover. Beide werkgroepen hebben daarna contact gelegd met MUTAVI, een researchgroep die zich richt op de vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van MUTAVI is het bereiken van een internationale, éénduidige naamgeving van mutaties gebaseerd op vederonderzoek.

Hoewel de drie genoemde groepen ieder hun eigen doelstelling hadden is constructief samengewerkt. De meeste tijd is gaan zitten in de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat op die manier een breed draagvlak is ontstaan voor de voorgestelde benamingen, mede door de verschillende publicaties van de werkgroep die in alle Nederlandstalige vogelbladen zijn verschenen. De gebruikte benamingen en genetische symbolen sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om de overgang gemakkelijker te maken vindt u in deze standaard de juiste benaming en de oude benaming vermeld in de tabel met de voornaamste mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zal worden. Het is even wennen maar recente naamsveranderingen zijn ook in korte tijd ingeburgerd geraakt. Als positief voorbeeld hiervan verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij de agapornis roseicollis. De discussie hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij de roseicollis is men er inmiddels al aan gewend dus bij de halsbandparkieten zal het ook wel meevallen. De werkgroep heeft het concept van de standaard Deel 1 op 3 mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd aan een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en parkietenorganisaties uit Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de keuzes die gemaakt zijn.

Lang niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden ontstaan en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is daarom een keuze gemaakt welke combinaties en mutaties beschreven moesten worden. Bij het algemener beschikbaar komen van die kleurslagen zullen aanvullingen op de standaard gemaakt dienen te worden.

De nu voorliggende standaard is het tweede deel van de standaard Edelparkieten. Hierin heeft de zelfde werkgroep de overige soorten van de Edelparkieten beschreven en de meest voorkomende mutaties. Op 27-08-06 is deze standaard gepresenteerd en besproken in Roosendaal besproken. Hierbij waren weer diverse vogelbonden en federaties bij aanwezig.

De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig aanvullingen op deze standaard verzorgen. De werkgroep bedankt de Werkgroep Edelparkieten van Euro -Parrot en MUTAVI voor de prettige samenwerking.

De KMV Tropische vogels en parkieten spreekt de hoop uit dat deze standaard mag bijdragen tot een eenduidige keuring van de Edelparkieten en dat deze standaard ook stimulerend mag werken op het aantal inzendingen op tentoonstellingen. Het KMV-bestuur bedankt hierbij de Werkgroep Halsbandparkieten PSC, bestaande uit de heren Alex de Graaf, Jan de Nijs en Piet Onderdelinden.

Bergen op Zoom, december 2006  
De KMV Tropische vogels en Parkieten

## 2: Algemeen

### 2a: Het geslacht Edelparkieten, genus *Psittacula*

#### Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht.

- 15 soorten met 20 ondersoorten, 2 uitgestorven, 1 soort zeer bedreigd met uitsterven en 1 twijfelachtige (onder)soort.
- formaten tussen 29 en 64 cm
- Strak bevederd, lange spits toelopende staart met 2 verlengde staartpennen
- Duidelijk geslachtsonderscheid, soms snavelkleur, soms tekening
- duidelijk verschil met jeugdkleed, na 1,5 – 2,5 jaar volledig op kleur
- Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen
- Holenbroeder
- Snelle vliegers, toch ook goede klauteraars
- Voeding: Zaden, granen en vruchten

#### Binnen het geslacht van de Edelparkieten worden de volgende soorten en hun ondersoorten onderscheiden:

- **Grote Alexanderparkiet** *P.eupatria*  
*P.e.eupatria* Grote Alexanderparkiet  
*P.e.nipalensis* Nepalese Alexanderparkiet  
*P.e.magnirostris* Andamanen Alexanderparkiet  
*P.e.avensis* Birma Alexanderparkiet  
*P.e.siamensis* Laos Alexanderparkiet
- **Halsbandparkiet** *P.krameri*  
*P.k.krameri* Afrikaanse halsbandparkiet  
*P.k.parvirostris* Abessijnse halsbandparkiet  
*P.k.borealis* Neumann's halsbandparkiet  
*P.k.manillensis* Indische halsbandparkiet
- **Mauritiusparkiet** *P.echo*  
*P.echo* Mauritiusparkiet of Echo-parkiet
- **Grijskopedelparkiet** *P.himalayana*  
*P.h.himalayana* Himalaya zwartkopedelparkiet  
*P.h.finschii* Finsch zwartkopedelparkiet
- **Pruimekopparkiet** *P.cyanocephala*  
*P.cyanocephala*
- **Rozekopparkiet** *P.roseata*  
*P.r.roseata* Rozekopparkiet of Bloesomkopparkiet  
*P.r.juneae* Birma Rozekopparkiet
- **Rotschild's parkiet** *P.intermedia*  
*P.intermedia* Rotschild's parkiet
- **Duifparkiet** *P.columboides*  
*P.columboides* Duif- of Malabarparkiet
- **Layard parkiet** *P.calthorpeae*  
*P.calthorpeae* Layard parkiet of Emeraldnek-parkiet of Blauwstaartparkiet
- **Seychellen parkiet †** *P.wardi* †  
*P.wardi* Seychellen edelparkiet
- **Newton's parkiet †** *P.exsul* †  
*P.exsul* Newton's edelparkiet

- **Derbyan parkiet** *P.derbiana*  
*P.derbiana* Derbyan of China-parkiet
- **Rozeborstbaardparkiet** *P.alexandri*  
*P.a.alexandri* Java rozeborstbaardparkiet  
*P.a.kangeanensis* Kangean rozeborstbaardparkiet  
*P.a.dammermanni* Dammerman's rozeborstbaardparkiet  
*P.a.perionca* Nias rozeborstbaardparkiet  
*P.a.major* Babi rozeborstbaardparkiet  
*P.a.cala* Simeulue rozeborstbaardparkiet  
*P.a.abbotti* Abbott's rozeborstbaardparkiet  
*P.a.fasciata* Indische rozeborstbaardparkiet
- **Blyth's parkiet** *P.caniceps*  
*P.caniceps* Blyth's of Nicobarenparkiet
- **Langstaart parkiet** *P.longicauda*  
*P.l.longicauda* Langstaart- of Malakkaparkiet  
*P.l.defontainei* Natuna langstaartparkiet  
*P.l.modesta* Roodkop langstaartparkiet  
*P.l.tytleri* Andamen langstaartparkiet  
*P.l.nicobarica* Nicobaren langstaartparkiet

Bij meerdere soorten binnen dit geslacht zijn mutaties ontstaan. In dit deel van de standaard beschrijven we echter alleen de mutaties en de kleurslagen van de Indische Halsbandparkiet. Deze soort is het meest gekweekt en hiervan zijn ook de meeste kleurslagen bekend.

#### **2b: Niet opgenomen soorten in deze standaard:**

Er zijn vier soorten niet in deze standaard opgenomen, twee ervan omdat ze helaas zijn uitgestorven en twee omdat ze niet gehouden worden in Europa en er te weinig gegevens over bent zijn.

Wel geven we een korte omschrijving van deze soorten, indien U een van deze soorten tegen komt (de niet uitgestorven wel te verstaan) dan contact opnemen met de KMV

#### **Echo of Mauritius parkiet ( *Psittacula echo*) Newton & Newton 1876**

Deze zeer zeldzame soort komt voor op het eiland Mauritius. Lijkt erg veel op de Afrikaanse halsband parkiet is met zijn 42 cm iets forser en zijn wat donkerder van kleur. De zwarte halsband van de man is ook wat breder. De snavel van de man is donkerrood met een gele punt en de ondersnavel zwart. De pop heeft een zwarte snavel een iets kortere staart en een geelgroene nekband.

#### **Blyth's parkiet ( *Psittacula caniceps*) Blyth 1846**

Over deze 56 grote Blyth's parkiet is nog zeer weinig bekend. Er zijn geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied is Kondul, Groot Nicobar en Monschall van de Nicobar eilanden.

De kop is licht lilagrijs, ze bezitten een brede baard, een zwarte voorhoofdsband en zijn verder overwegend groen van kleur. Poppen hebben een zwarte snavel mannen een rode boven en zwarte onder. Verder hebben poppen meer blauw in de kop en is de staart veel korter.

#### **2c: Uitgestorven soorten:**

##### **Newton's parkiet ( *Psittacula exsul*)**

Deze 40 cm grote edelparkiet is omstreeks 1875 uitgestorven

Uiterlijk waren dit zeegroen gekleurde halsband parkieten.

##### **Seychelles parkiet ( *Psittacula wardi*)**

Deze 41 cm grote Edelparkiet is begin 20<sup>ste</sup> eeuw uitgestorven.

Een volwassen man had een zwarte band en het achterhoofd was blauwovergoten. Beide geslachten hadden een rode snavel en een roodbruine vleugelvlek.

Verdere gegevens zijn er niet bekend.

### 3: Veerstructuur en mutaties.

#### 3a: Veerstructuur van de Edelparkieten.

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- a. zwart eumelanine
- b. geel psittacine
- c. rood psittacine

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de zgn. blauwstructuur. Deze gecombineerd met het gele psittacine in de cortex geeft de baard haar groene kleur.

De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de kleuren van de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnavels. De vogels tonen een lichte waas in het grootste deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen de kleur van de ondersnavel, waar zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties. Dit geldt ook voor de oog- en pootkleur.

#### 3b: De mutaties bij de Edelparkieten.

##### BLAUW

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex. Opvallend is dat de kleur van de snavel, evenals de kleur van de oogringen (washuid) rood blijft. Dat deze mutatie niet uitsluitend het gele psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de nekband. Deze is wit in plaats van roze. De reductie beperkt zich dus tot de bevedering.

Vererving: autosomaal recessief,

Symbol: *bl*

##### TURQUOISE.

Deze mutatie zorgt voor een partiële psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer 30 % is. In de praktijk blijkt dat de werking van deze mutatie ligt tussen de 10 en 90%, dit geeft een grote variatie in kleur. Een lastig punt bij deze kleurslag vormt de egaliteit, vooral op het rugdek.

Bij halsbandparkieten werd deze mutatie pastelblauw genoemd. Deze mutant heeft echter niets met pastel te maken. Het is dezelfde mutant die bij andere kromsnavels zeegroen heet en bij grasparkieten geelmasker wordt genoemd. Vanwege het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is hier gekozen voor turquoise, een naam die in meerdere talen bekend is.

De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw en aqua, waarbij het psittacinebezit dominant is. De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise – blauw.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *bl<sup>aq</sup>*

##### AQUA.

Ook deze mutatie zorgt voor een partiele psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze voor ongeveer 50% is. Het verschil met de turquoise is dat de aqua veel egalier van kleur is .

De aqua is de nieuwe naamgeving voor zeegroen ook vaak foutief pastelblauw genoemd.

De werking van de aqua is dat het psittacine gerduceerd wordt en het melanine ongewijzigd blijft

Vererving autosomaal recessief

Symbol: *bl<sup>aq</sup>*

##### CINNAMON

Door een onvolledige oxydatie van het eumelanine wordt dit niet zwart maar blijft bruin van kleur. De kleur welke vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie melanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd. Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin. De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden.

Vererving: geslachtsgebonden recessief

Symbol: *Xcin*

##### PALLID

Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve melaninereductie. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht

mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat. Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden. Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met ino. Deze mutatie wordt dan ook veelvuldig ingekweekt. Het resultaat is dat er veel vogels zijn met een te bleke lichaamskleur.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xino<sup>pd</sup>*.

### **FALLOW**

De fallowmutatie zorgt ervoor dat er geen pigmentafzetting is in de ogen en in de hoorndelen. De ogen zijn dus nu helder rood van kleur, de poten zijn vleeskleurig en de nagels hoornkleurig. De lichtere kleur van het eumelanine komt ook tot uiting in de kleur van de ondersnavel. Deze is niet meer zwart maar donkerrood. Tevens zijn de pigmentkorrels, die in de bevedering aanwezig zijn, kleiner van afmeting. Hierdoor is er meer reflectie van licht wat een lichaamskleur geeft die een nuance lichter is. Er is ook een onvolledige oxydatie van de eumelaninekorrels, waardoor deze bruin van kleur blijven. Net als bij een aantal andere parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet twee types fallow ontstaan: de (brons) fallow (de donkere vorm) en de palefallow (de lichte vorm, herkenbaar aan de rode ogen zonder iris).

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *a<sup>bz</sup>* voor de (bronzefallow) en *cf* voor de palefallow (clearheadfallow).

### **DOMINANT GEZOOMD**

Een kwantitatieve melaninereductie, waarbij het ideaal een reductie van 50% is. De variatiebreedte is echter groot. De koptekening waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt wel lichter van kleur maar kan nog het best als zwart omschreven worden. De kleur van de pennen is typisch voor de pastelmutatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *Ed*, van het Engelse Edged Dilute.

### **DONKERFACTOR**

Veroorzaakt een minder diepe bewolkte zone waardoor er meer absorptie van licht is. Hierdoor wordt de lichaamskleur donkerder. De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant

Symbool: *D*

### **GRIJSFACTOR**

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats. In de groen, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. grijsgroen, turquoise grijs en grijs genoemd.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *G*.

### **VIOLETFACOR**

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met een donkerfactor. Met een enkele donkerfactor ontstaat de typische violetkleur. Bij een dubbele donkerfactor is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant

Symbool: *V*.

### **BLEEKSTAART**

Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelaninereductie. Dit is het geval in de staart, de onderstaartdekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De melaninereductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opleken van de kleur gaat geleidelijk en het duurt drie jaar voordat de vogel volledig op kleur is. In de rest van de bevedering moet de kleur maximaal zijn om een zo groot mogelijk contrast te verkrijgen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *ct* (cleartail)

### **SL INO-FACTOR**

Een totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

SL staat voor sex –linked geslachtsgebonden in het Engels

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xino*

### **RECESSIEF INO-FACTOR**

Net als bij de SL ino factor heft de recessief ino factor dezelfde werking van een totale reductie van het melanine in de bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *a*

### **RECESSIEF BONT**

Een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreekt dus de koptekening bij de mannen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *s*

### **OPALINE**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xop*

### **MISTY**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 75%.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *Mt*.

### **OVERGOTEN**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 20%.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *Dil*, van het Engelse Dilute.

**3c: Toelichting benamingen:**

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de halsbandparkieten en daarmee Edelparkieten. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. grasparkieten. Wij verwachten dan ook dat de kwekers na een overgangperiode algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd.

Standaard naam mutatie	Oude benaming
Groen	Wildkleur
Blauw	Blauw
Cinnamon	Isabel
Pale (bleekop) Fallow	Buttercup, geelkop roodoog, dun fallow
Bronze Fallow	Recessief cinnamon
Grijsgroen	Olijf
Grijs	Grijs
Turquoise	Pastelblauw, Zeegroen
Lutino	Geel
Dominant gezoomd	Fallow, Pastel
Overgoten	Gele/witte zwartoog
Pallid	Lacewing, Isabel
D Groen	Donkergroen
DD Groen	Olijfgroen
Bleekstaart	Geelkop geelstaart
Misty	Bleekgroen
Opaline	Grijskop
Recessief Bont	Afr. Bont, Opaline
Violet	Amerikaans Kobalt
D blauw	Kobaltblauw
DD blauw	Mauve

Noot: De benaming D Groen, DD Groen, D blauw en DD Blauw zullen pas in het keurseizoen worden doorgevoerd.

**3d: De kleurvererving van de Edelparkieten mutaties.**

Voor een uitgebreide behandeling van de regels van de erfelijkheidsleer wordt verwezen naar het werkje "Algemene erfelijkheidsleer" verkrijgbaar op het bondsbureau van de NBvV.

**Autosomaal recessief verervende mutaties.**

<i>Turquoise</i>	<i>Reductie psittacine tot 30 %, multiple allele van de blauwfactor Symbool: <math>bt^{tq}</math></i>
<i>Blauw</i>	<i>Volledige reductie psittacine. Symbool: <i>bl</i></i>
<i>Brons Fallow</i>	<i>De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerrood. Oogkleur rood met geelachtige iris. Symbool: <math>a^{bz}</math></i>
<i>Pale Fallow</i>	<i>Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donker rood. Oogkleur rood zonder zichtbare iris. Symbool: <i>cf</i></i>
<i>Bleekstaart</i>	<i>Plaatselijke reductie van eumelanine in kop, staart en onderbuik Symbool: <i>ct</i></i>
<i>Recessief bont</i>	<i>Onregelmatig bontpatroon. Koptekening ontbreekt Symbool: <i>s</i></i>
<i>Recessief Ino</i>	<i>Volledige reductie eumelanine Symbool: <i>a</i></i>
<i>Overgoten</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 20% Symbool: <i>Dil</i></i>

**Autosomaal dominant verervende mutaties.**

<i>Grijs</i>	<i>Door verandering inwendige vederstructuur geen reflectie van blauw Symbool: <i>G</i></i>
<i>Dominant Gezoomd</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 50%, in het hart van de veer. De veerranden hebben bijna volledig pigment Symbool: <i>Ed</i></i>
<i>Misty</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 75% Symbool: <i>Mt</i></i>

**Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties.**

<i>Donkerfactor</i>	<i>Door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder wordt. Symbool: <i>D</i></i>
<i>Violetfactor</i>	<i>De structuur van de sponszone is veel fijner geworden waardoor er interferentie optreedt met als gevolg het terugkaatsen van violet in plaats van blauw licht. Symbool: <i>V</i></i>

**Geslachtgebonden recessief verervende mutaties.**

<i>Ino</i>	<i>Volledige reductie eumelanine Symbool: <i>Xino</i></i>
<i>Cinnamon:</i>	<i>Kwalitatieve reductie van het eumelanine. Dit is bruin in plaats van zwart van kleur Symbool: <i>Xcin</i></i>
<i>Pallid</i>	<i>Reductie van eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met <i>ino</i> Symbool: <math>Xino^{pd}</math></i>
<i>Opaline</i>	<i>Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Toont vleugelspiegel. Symbool: <i>Xop</i></i>

**Geslachtgebonden dominant verervende mutaties.**

Zijn nog niet bekend.

#### 4: Standaard Edelparkieten

##### 4a. Afrikaanse Halsbandparkiet

In deel 1 van deze standaard wordt de Indische halsbandparkiet beschreven en zijn mutaties. In deel 2 wordt alleen de Afrikaanse halsbandparkiet beschreven. Ter vergelijking is ook de beschrijving van de wildkleur Indische Halsbandparkiet opgenomen.

##### *Afrikaanse halsbandparkiet (Psittacula krameri krameri) Scopoli 1769*

**Algemeen: Herkomst West Afrika, Senegal, Luanda en Zuid Susan.**

**Formaat: 40 cm**

**Ringmaat: 6 mm**

##### **De fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet**

###### **Conditie:**

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

###### **Formaat:**

De lengte van de Afrikaanse halsbandparkiet is 40 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

###### **Model:**

Een ideale Afrikaanse halsbandparkiet is een slanke vogel in verhouding tot de Indische halsbandparkiet. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn smal. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

###### **Houding:**

De Afrikaanse halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 70 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout.

De dijen zijn zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

###### **Kop:**

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol. De snavelbasis is smal. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

###### **Poten:**

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

###### **Snavel:**

De snavel is smal. De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de in de bovensnavel.

###### **Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is relatief lang, gesloten en aan het enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

<b>Kleurslag/soort</b>	<b>Man: Afrikaanse halsbandparkiet 40 cm</b>	<b>Pop: Afrikaanse halsbandparkiet 39 cm</b>	<b>Man: Indische halsbandparkiet 42 cm</b>	<b>Pop: Indische halsbandparkiet 41 cm</b>
<b>Formaat:</b>				
<b>Kleur:</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>
Voorhoofd en wangen. Achterkop	Helder lichtgroen  Groen met blauwe waas	Grasgroen, iets doffer dan bij de man	Helder lichtgroen  Groen met hemelsblauwe waas	Lichtgroen, doffer dan bij man
Hals en borst	Grasgroen	Grasgroen	Groen, lichtgrijs bewaasd	Groen, zeer licht grijsachtig bewaasd
Buik	Egaal grasgroen	Egaal grasgroen	Egaal lichtgroen	Egaal lichtgroen
Mantel en onderrug	Grasgroen	Grasgroen	Groen met iets grijze aanslag	Groen met iets grijze waas
Stuit	Helder grasgroen	Helder grasgroen	Helder groen	Helder groen
Hand - en armpennen	Donkergroen, buiten vlag diep groen, binnenvlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen	Donkergroen, buitenvlag grasgroen, binnen vlag donkergroen. Binnenzijde geelgroen	Grijszwart, buiten - vlag diepgroen, binnen - vlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen	Grijszwart, buiten vlag diepgroen, binnen vlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen
Vleugel dekveren	Groen, iets bewaasd Duimveertjes groen	Grasgroen, iets bewaasd Duimveertjes groen	Groen iets bewaasd  Duimveertjes groen	Groen iets bewaasd  Duimveertjes groen
Middelste staartpennen	Helder groen overgaand in blauw met een geel puntje	Heldergroen overgaand in blauw met een geel puntje	Heldergroen overgaand in blauw met een geelgroen puntje	Heldergroen overgaand in blauw met een geelgroen puntje
Overige staartpennen	Helder groen	Helder groen	Heldergroen	Heldergroen
Onderzijde onderstaart dekveren	Geelgroen Groen	Geelgroen Groen	Geelgroen Groen	Geelgroen Groen
Bovenstaart dekveren	Heldergroen	Groen	Heldergroen	Groen
Snavel	Donkerrood met zwarte waas en snavel punt Onder snavel zwart.	Donkerrood met zwarte waas en snavel punt. Ondersnavel zwart	Dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis	Dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Donkervleeskleurig
Nagels	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Zwartgrijs
Ogen	Zwart, met smalle bleke iris.	Zwart met smalle bleke iris	Zwart met smalle bleke iris	Zwart met smalle bleke iris
<b>Tekening:</b>				
Voorhoofdsband	Zwart	Grijsgroen	Zwart	Grijsgroen
Keel	Zwart	n.v.t.	Zwart	n.v.t.
Hals/nekband	Zwart, in nek overgaand in diep roze. Boven de nekband een smalle blauwe rand	Vaag groen	Zwart, in nek overgaand in diep roze	Dof grijs/bruin, op de plaats van het roze van man lichtgroen
Vleugelpennen	Slagpennen fijne crème zoom	Slagpennen fijne crème zoom	Slagpennen fijne crème zoom	Slagpennen fijne crème zoom
Vleugelbocht	Geel	Geel	Geel	Geel
Ooglid	Roze	Roze	Bleekroze	Bleekroze
Oogring	Rood	Rood	Rood	Rood

**Keurtechnische aanwijzingen: Afrikaanse halsband parkiet**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Het missen van een of meerdere nagels is een veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleuren bij de Edelparkieten niet de helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavel verwacht mag worden. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang,het is geen scherpe afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn.

De keeltekening en de nekband bij de man dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is in het geheel matter van kleur,maar dient wel zo egaal mogelijk te zijn op rug –en vleugeldek. De pop mist de nekband,door een andere vederstructuur ter plaatse is er wel nog een vage groene nekband zichtbaar,de kleur is wat helderder dan de kop zelf.

De nekband bij de man is pas in het derde levens jaar volledig op kleur,indien er in het tweede jaar al enige vorm va

Buiten het formaat is de Afrikaanse halsband direct te herkennen aan de donkerrode bovensnavel met zwarte punt t.o.v. de Indische halsband,ook is de kop wat ronder van vorm.

De benaming bij het keuren kan volstaan met alleen Afrikaanse halsband parkiet,zonder toevoeging van wildkleur of lichtgroen. Mannen worden in schaal 1 gekeurd,poppen in schaal 2.

Mutanten niet bekend of te weinig gegevens over.

Voor alle duidelijk is de Indische halsband in deze standaard naast de Afrikaanse geplaatst. Voor mutanten van de Indische halsband verwijzen wij U naar deel 1 standaard Edelparkieten,waar de Indische halsband geheel is in omschreven.

**Keurtechnische aanwijzingen: Indische halsbandparkiet**

Zie Afrikaanse halsband en deel 1 van standaard Edelparkieten.

#### **4b. Roze borstbaard parkieten**

**Algemeen:** Van de roze borstbaard parkieten zijn 7 ondersoorten, die qua formaat en kleur van de snavel verschillend zijn, hiervan worden er 4 omschreven in deze standaard. De andere 3 ondersoorten komen zover bekend niet voor in West – Europa en/of de onderlinge verschillen te minimaal. De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

##### **Java roze borstbaard parkiet (*Psittacula alexandri alexandri*) Linne 1758.**

Dit is de nominaatvorm en komt voor op Java, Bali, Indonesie en het zuiden van Borneo, waar hij waarschijnlijk is ingevoerd.

Formaat: 33 cm

Ringmaat 6,5 mm.

##### **Dammerman's roze borstbaard parkiet (*Psittacula alexandri dammermani*) Chasen und Kloss 1932**

Deze ondersoort komt voor op de Karimundjawa eiland en Indonesie.

Formaat: 36 cm

Ringmaat: 7 mm

##### **Nias rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri perionca*) Oberholser 1912**

Deze ondersoort komt voor op Nias eiland en Indonesie.

Formaat: 37 cm

Ringmaat: 7 mm

##### **Simeulue rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri cala*) Oberholser 1912**

Deze ondersoort komt voor op de Simeulue eiland en Indonesie

Formaat: 36 cm

Ringmaat 7 mm

##### **Indische rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri fasciata*) P.L.S. Muller 1776**

Deze ondersoort is zowel in de natuur als bij de kwekers de meest voorkomende soort, er zijn dan ook al een aantal mutanten bij opgetreden.

Het verspreidingsgebied is Noord –India, Nepal tot Assam, Oost –Pakistan, Bangla Desh, Burma, Thailand, Indochina, als ook Hainan eiland en Mergui Archipelago.

Formaat: 33 cm

Ringmaat: 6 mm

#### **Niet omschreven rozeborstbaard parkieten:**

##### **Babi rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri major*) Richmond 1902**

Zoals de toevoeging *Major* al aangeeft, is de Babi rozeborstbaard parkiet met zijn 38 cm de grootste ondersoort, binnen de groep rozeborstbaard parkieten. Hij lijkt veel op de Indische ondersoort, maar verschil vooral in formaat. Ook mist de Babi de blauwe en groene waas in de kop. De borstkleur is ook wat dieper en mist de lila waas. De Babi rozeborstbaard parkiet komt voor op de Babi –en Lasia Eilanden.

##### **Andamen rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri abotti*) Oberholser 1919**

De Andamen rozeborstbaard parkiet komt ook veel overheen met de Indische ondersoort, is alleen (36 cm) wat groter en over het algemeen wat lichter van kleur. De kop toont wel de blauwe waas, maar geen groene waas, ook de borstkleur is wat bleker met lila waas.

Deze ondersoort komt alleen voor op de Andamen Eilanden.

##### **Kangean rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri kangeanensis*) Hoogerwerf 1962**

Deze laatst ontdekte ondersoort verschilt maar weinig met de Dammerman's ondersoort. De snavel is groter en de kop mist de groene waas. De schouderlekken zijn helderder geel. Het formaat is 35 cm. De snavel bij zowel man als pop rood. Deze ondersoort komt alleen voor op de Kangean Eilanden.

#### **Noot:**

Wanneer U een van deze 3 niet beschreven ondersoorten tegen komt, verzoeken wij U dit te melden bij de KMV tropische vogels en parkieten. Indien nodig zullen ze dan alsnog opgenomen gaan worden in deze standaard.

## De fysieke standaard van de rozeborstbaard parkiet

### Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

### Formaat:

De lengte van de rozeborstbaard parkieten, zit tussen de 33 cm en 38 cm in. T.o.v. de overige Edelparkieten hebben de rozeborstbaard parkieten een relatief korte staart.

### Model:

Een ideale rozeborstbaard parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

### Houding:

De rozeborstbaard parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok omklemmen, dat de vogel vrij van stok hout.

De dijnen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

### Kop:

De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

### Poten:

Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

### Snavel:

De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

### Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is relatief kort, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

Kleurslag	Man: Java roze borstbaard parkiet	Pop: Java roze borstbaard parkiet	Man: Dammerman's rozeborstbaard parkiet 36 cm	Pop: Dammerman's rozeborstbaard parkiet 36 cm	Man: Nias rozeborstbaard parkiet	Pop: Nias rozeborstbaard parkiet 37 cm
Formaat:	33 cm	33 cm			37 cm	
Kleur:	groen	groen	groen	groen	groen	groen
Kop	Helder grijs met blauwe waas	Helder grijs met vage blauwe waas	Helder blauwgrijs, voorhoofd iets groene waas	Helder blauwgrijs met vage blauwe waas.	Lila op een grijze ondergrond. Voorhoofd groene waas.	Gelijk aan man, iets vager
Nek	Heldergroen	Heldergroen	Lichtgroen	Lichtgroen	Heldergroen	
Hals en borst	Diep oranjerode met iets lila waas	Gelijk aan man, iets doffer van kleur	Diep rozerood	Gelijk aan man, iets doffer	Rozerood, met lila waas	Gelijk aan man, iets doffer
Buik	Groen met iets blauwe waas		Lichtgroen		Lichtgroen	
Mantel en onderrug	Groen met iets grijze waas	Gelijk aan man	Heldergroen, iets bewaasd	Gelijk aan man	Heldergroen met iets grijze waas.	Gelijk aan man
Stuit	Heldergroen		Helder lichtgroen		Helder lichtgroen	
Hand - en armpennen	Groen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is diepgroen, binnenvlag zwartgrijs. Geelgroen	Gelijk aan man	Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen, binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan man	Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen, Binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man
Binnenzijde			Geelgroen		Geelgroen	
Vleugel dekveren	Groen, iets bewaasd	Gelijk aan man	Heldergroen	Gelijk aan man	Heldergroen, iets bewaasd	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Heldergroen overgaand in blauw	Gelijk aan man	Helder lichtgroen overgaand in iets blauw .	Gelijk aan man	Heldergroen overgaand in blauw aan de toppen	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren.	Groen	Gelijk aan man	Lichtgroen	Gelijk aan man	Heldergroen	Gelijk aan man
Onderzijde staart	Groen		Lichtgroen		Heldergroen	
Onderzijde staart	Geelgroen		Geelgroen		Geelgroen	
Bovenstaartdekveren	Heldergroen	Gelijk aan man	Helder lichtgroen	Gelijk aan man	Heldergroen	Gelijk aan man
Snavel	Rood met gele punt, ondersnavel oranjerood	Iets lichter dan bij man	Dieporanjerode, snavelpunt geel. Ondersnavel oranjerode	Oranjerode snavelpunt iets lichter. Onder snavel iets lichter	Oranjerode, snavel punt geel. Ondersnavel zwart	Zwart
Snavelrand Neusdop	Bleek Hoornkleurig	Gelijk aan man	Bleek Hoornkleurig	Gelijk aan man	Bleek Hoornkleurig	Gelijk aan man
Poten	Grijs	Grijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Donkervleeskleurig	Donkervleeskleurig
Nagels	Donkergrijs	Donkergrijs	Grijs	Grijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Ogen	Zwart met smalle bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris
<b>Tekening:</b>						
Keel	Zwart, onderzijde licht lila rand	Zwart	Zwart, onderzijde een lichte lila rand	Zwart	Zwart, onderzijde lila rand	Zwart
Voorhoofdsband	Zwart	Zwart, iets smaller dan bij man	Zwart	Zwart, iets smaller dan bij man	Zwart	Zwart, iets smaller dan bij man
Oogring	Iets groen	Iets groen	Iets lichtgroen	Iets lichtgroen	Iets groen	Iets groen
Kop/nek	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Nekband (pop)	n.v.t.	Rozerode	n.v.t.	Bleek roze	n.v.t.	Lila roze
Borst/buik	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Vleugelbalk	Geelgroen	Geelgroen	Geel met groene waas, aan onderzijde gezoomd	Gelijk aan man, iets doffer	Geelgroen	Gelijk aan man, iets doffer
Vleugelpennen	Iets gezoomd	Iets omzoomd	Iets omzoomd	Iets omzoomd	Iets omzoomd	Iets gezoomd
Vleugelrand	Bleekgeel	Bleekgeel	Bleekgeel	Bleekgeel	Bleekgeel	Bleekgeel

Kleurslag	Man: Simeulue rozeborstbaard parkiet 36 cm	Pop: Simeulue rozeborstbaard parkiet 36 cm	Man: Indische rozeborstbaard parkiet 33 cm	Pop: Indische rozeborstbaard parkiet 33 cm	Man: Indische rozeborstbaard parkiet	Pop: Indische Rozeborstbaard parkiet
Formaat:						
Kleur:	groen	groen	groen	groen	D groen	D groen
Kop	Blauwgrijs	Blauwgrijs iets donker dan bij man	Helder blauwgrijs, met lila waas, voorhoofd groen bewaasd Groen	Gelijk aan man iets donker	Helder blauwgrijs, met lila waas, voorhoofd iets groener waas Donkergroen	Gelijk aan man iets donker
Nek	Diepgroen					
Hals en borst.	Lila roze	Gelijk aan man ,iets donker	Diep roze met lila waas Groen	Diep roze, zonder lila waas Groen	Diep roze met lila waas Donkergroen	Diep roze, zonder lila waas Donkergroen
Buik	Zeegroen, dijen groen					
Mantel onderrug	Grijsgroen	Gelijk aan man	Diepgroen, iets bewaasd Groen	Gelijk aan man	Diep donkergroen, iets bewaasd Donkergroen	Gelijk aan man
Stuit	Diepgroen					
Hand - en armpennen	Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag donkergroen, binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan man	Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diepgroen, binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan man	Diep donkergroen overgaand in grijs-zwarte toppen. Buitenvlag diep donkergroen, binnenvlag zwartgrijs Geelgroen	Gelijk aan man
Binnenzijde	Geelgroen		Geelgroen			
Vleugel dekveren	Grijsgroen	Gelijk aan man	Diepgroen iets bewaasd	Gelijk aan man	Diep donkergroen, iets bewaasd	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Diepgroen overgaand in blauw	Gelijk aan man	Groen overgaand in blauw	Gelijk aan man	Donkergroen overgaand in kobaltblauw	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren Onderzijde staart	Diepgroen Diepgroen Geelgroen	Gelijk aan man	Groen Groen Geelgroen	Gelijk aan man	Donkergroen Donkergroen Geelgroen	Gelijk aan man
Bovenstaart dekveren	Diepgroen	Gelijk aan man	Groen	Gelijk aan man	Donkergroen	Gelijk aan man
Snavel	Oranjerood met gele punt, ondersnavel zwart	Zwart	Rood met gele punt, ondersnavel zwart.	Zwart	Rood met gele punt, ondersnavel zwart	Zwart
Snavelrand Neusdop	Bleek Hoorinkleurig	Gelijk aan man	Bleek Hoorinkleurig	Gelijk aan man	Bleek Hoorinkleurig	Gelijk aan man
Poten	Grijs	Grijs	Donkervleeskleurig	Donkervleeskleurig	Grijs	Grijs
Nagels	Donkergrijs	Donkergrijs	Grijs	Grijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
Ogen	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris
Tekening:						
Keel	Zwart, onderzijde lila rand	Zwart	Zwart, onderzijde lila roze rand	Zwart	Zwart, met lila rand	Zwart
Voorhoofdsband	Zwart	Zwart ,iets smaller dan bij man	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Oogring	Vaag groen	Vaag groen	Groen	Groen	Donkergroen	Donkergroen
Kop/nek en borst/buik	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Nekband (pop)	n.v.t.	Lila roze	n.v.t.	Diep roze	n.v.t.	Lila roze
Vleugelbalk	Groengeel	Groengeel iets vager dan bij man	Geelgroen	Geelgroen iets vager dan bij man	Geelgroen	Geelgroen iets vager dan bij man
Vleugelpennen Vleugelrand	Licht omzoomd Bleekgeel	Licht omzoomd Bleekgeel	Licht omzoomd Bleekgeel	Licht omzoomd Bleekgeel	Licht omzoomd Bleekgeel	Licht omzoomd Bleekgeel

**Mutanten :Indische rozeborstbaard parkieten**

Kleurslag	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur:	Grijsgroen	Grijsgroen	Turquoise	Turquoise	Blauw	Blauw
Kop	Grijs met lila waas	Grijs	Licht paars met roze waas, bij voorhoofd meer blauw.	Grijs met roze waas,bij voorhoofd meer blauw	Licht lila,bij voorhoofd meer blauw	Gelijk aan man,iets vager
Nek	Grijsgroen	Grijsgroen	Zeegroen	Zeegroen	Blauw	
Hals en borst	Roze/lila, met grijze waas	Roze met grijze waas	Licht paars met roze waas	Lila met roze waas	Licht lila	Gelijk aan man iets vager
Buik	Grijsgroen	Grijsgroen	Zeegroen	Zeegroen	Blauw	
Mantel onderrug	Grijsgroen met lichte waas	Gelijk aan man	Diep zeegroen met lichte waas	Gelijk aan man	Diep blauw met lichte waas	Gelijk aan man
Stuit	Grijsgroen		Zeegroen		Blauw	
Hand - en armpennen	Grijsgroen overgaand in grijszwarte toppen,buitenvlag grijsgroen,binnen vlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Zeegroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diep zeegroen,binnen vlag zwartgrijs.	Gelijk aan man	Diep blauw overgaand in grijszwarte toppen. buitenvlag diepblauw,binnen vlag zwartgrijs.	Gelijk aan man
Binnenzijde	Geelgrijs		Bleek geelgroen		Wit met blauwe waas	
Vleugel dekveren	Grijsgroen	Gelijk aan man	Diep zeegroen met lichte waas	Gelijk aan man	Diep blauw met lichte waas	Gelijk aanman
Middelste staartpennen	Grijsgroen overgaand in grijze toppen	Gelijk aan man	Zeegroen overgaand in blauwe toppen	Gelijk aan man	Blauw overgaand in diep blauw toppen	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Grijsgroen	Gelijk aan man	Zeegroen	Gelijk aan man	Blauw	Gelijk aan man
Onderzijde staart	Grijsgroen		Zeegroen		Blauw	
Bovenstaart dekveren	Geelgrijs		Bleek geelgroen		Wit met blauwe waas	
Snavel	Grijsgroen	Gelijk aan man	Zeegroen	Gelijk aan man	Blauw	Gelijk aan man
Snavelrand	Rood met gele punt, ondersnavel zwart	Zwart	Rood met gele punt, ondersnavel zwart	Zwart	Rood met bleke punt, ondersnavel zwart	Zwart
Neusdop	Bleek Hoornkleurig	Gelijk aan man	Bleek Hoornkleurig	Bleek Hoornkleurig	Bleek Hoornkleurig	Bleek Hoornkleurig
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Ogen	Zwart,met bleke iris	Zwart ,met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris
<b>Tekening:</b>						
Keel/baard	Zwart,onderzijde een lila grijze rand	Zwart	Zwart,onderzijde lila rand	Zwart	Zwart,onderzijde lila rand	Zwart
Voorhoofdsband	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Oogring	Vaag grijsgroen	Vaag grijsgroen	Lichtzeegroen	Lichtzeegroen	Blauw	Vaag blauw
Kop/nek en borst/buik	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Nekband (pop)	n.v.t.	Roze met grijze waas	n.v.t.	Bleek roze	n.v.t.	Wit
Vleugelbalk	Geelgrijsgroen	Geelgrijsgroen iets vager dan bij man	Bleek geelgroen	Bleek geelgroen,vager dan bij man	Lichtgrijs	Dof grijs
Vleugelpennen	Licht omzoomd	Licht omzoomd	Licht omzoomd	Licht omzoomd	Licht omzoomd	Licht omzoomd
Vleugelrand	Bleekgeel	Bleekgeel	Wit met vage gele waas	Wit met vage gele waas	Wit	Vage witte pareltekening

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Java rozeborstbaard parkiet:**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dienen te worden bestraft. Ook een goede conditie is een eerste vereiste.

Het missen van een of meer nagels is een veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient rekening te worden gehouden ,dat de kleuren van de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Wel dient er streng gelet op te worden dat de lichaamskleur geen zwarte omzoming toont,dit komt door het afknagen van de veer toppen. De kleurscheiding tussen borst en buik dient zo strak mogelijk te zijn,de diepst gekleurde borstkleur geniet de voorkeur. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keel/baard tekening loopt strak vanaf de ondersnavel tot in de nek en met een boog onderlangs de hals. De voorhoofdsband is enkele millimeters en loopt van oog tot oog. De vleugelbalk dient zo strak mogelijk te zijn aan onderzijde iets soepeler beoordelen.

De pop is over het algemeen doffer van kleur en tekening en is vooral te herkennen aan de rozerode nekband dit geldt ook bij alle ondersoorten.

Beide geslachten bezitten een rode snavel.

Hier zit ook het grootste verschil in met de Indische rozeborstbaard parkiet waarbij de pop een zwarte snavel bezit en de man hiervan een zwarte ondersnavel heeft. Ook is de kopkleur van de Java meer grijs en minder blauw bewaasd.

Jonge vogels hebben een groene kop met een grijze aanslag een groenachtige borst en kortere staart. Op 2 jarige leeftijd krijgen ze het volwassen verenkleed,die meestal op 2 jarige leeftijd compleet is.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Dammerman's rozeborstbaardparkiet:**

Deze ondersoort gelijk erg veel op de Java,maar zijn duidelijk groter en een veel forsere snavel. De kleur van de snavel is wel gelijk. De kruin is wat blauwer van tint en de lichaamskleur helderder groen. Ook de schoudervlek en nek zijn helderder ,meer geel.

Zie ook KTA bij Indische -en Java rozeborstbaard parkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Nias rozeborstbaard parkiet:**

Volwassen vogels lijken op de Indische rozeborstbaard parkieten,maar is groter van formaat.

Ook de gehele lichaamskleur is helderder dan bij de Indische. De grijze kop mist blauwe en groene aanslag en de borst mist de lila waas.

Verder (incl) snavel gelijk aan Indische rozeborstbaard parkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Simuelue rozeborstbaard parkiet:**

Deze ondersoort lijkt veel op de Indische ondersoort,maar is iets groter. Ook is de kleur wat lichter en opvallend is de zeegroene buikkleur en groene dijen. De grijze kop mist de groene waas en de borstkleur is lichter en mist de lila waas.

De snavelkleur is wel gelijk aan de Indische.

Zie ook de Java –en Indische rozeborstbaard parkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet:**

Dit is de meest gehouden baard parkiet . De pop is vager van kleur. Komt veel overheen met de Java ,de snavelkleur is het grootste verschil,deze is bij de Indische bij de man zwart aan de ondersnavel en bij de pop geheel zwart. Ook is de borstkleur dieper roze en heeft een lila waas en de kop is blauwer en rond de snavel groen bewaasd. De vleugelbalk is weer doffer bij de Indische. De buik toont wat blauwe waas. Poppen missen de lila waas op de borst.

Advies bij het keuren wanneer het formaat duidelijk afwijkt ,om de andere ondersoorten te bestuderen en dan keuren waar het dichtst bij komt.

Zie ook Java rozeborstbaard parkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Mutanten van de Indische rozeborstbaard parkiet:**

Tot nu toe zijn er enkel bij de Indische ondersoort mutaties opgetreden,uiteraard kan dit ook bij de overige soorten gebeuren. De snavelkleur kan hierbij een duidelijke indicatie zijn! Men dient er dan wel streng op te letten dat de onderling verschillen zoals bij de wildkleuren ook waarneembaar zijn ,evenals het formaat.

Alle ontstaande mutanten zijn nog niet opgenomen in deze standaard,omdat hier nog niet genoeg of juiste gegevens over bekend zijn. Indien U niet omschreven mutaties of combinaties hiervan tegen komt ,zowel bij kweker,vogelbeurs of tentoonstelling,dan dit melden bij Uw keurmeester vereniging sectie grote parkieten en /of werkgroep edelparkieten.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet donkergroen:**

Bij deze nog zeldzame mutatie zijn alle groene veervelden nu donkergroen geworden, ook het blauw in de staart is nu kobaltblauw geworden. De snavelkleur en borstkleur blijven gelijk. Ook de vleugelbalk is gelijk van kleur als bij de wildkleur, alleen geeft dit nu een groter contrast met het donkergroene rug/vleugeldek.

*De donkergroene is een vogel met 1 donker factor bij zich, uit de paring donkergroen x donkergroen komen dan ook DD groen, vogels met een dubbele donker factor, welke in het verleden olijfgroen genoemd werden.*

De donker factor vererft autosomaal dominant.

Verder gelijk aan groen en Java.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet grijsgroen:**

Ook deze mutatie is nog erg zeldzaam. De grijsgroen wordt door kwekers vaak foutief als olijf benoemd.

Hoewel de kleur wel iets olijfvachtig heeft is, de olijf de oude benaming van een dubbele donkerfactor.

Het grootste verschil zit in het blauw bezit, dit wordt bij een dubbele donkerfactor mauve en bij de grijsgroen grijs van kleur. Bij de meeste parkietensoorten met een van oorsprong blauwe staart, wordt dit bij de grijsgroene zwart/grijs van kleur. Bij de Indische rozeborstbaard parkiet zien we dit ook, evenals een grijze waas over de grijsgroene lichaamskleur.

De lila waas in de kop komt door het rode carotenoïde bezit in de kop. Zowel het rood als geel carotenoïde worden niet aangetast door de grijs factor. De vleugelpennen laten ook geen blauw, maar grijs zien. Dat de borst roze/lila is komt door de vermenging van rood met grijs. We moeten streven naar een zo diep mogelijke grijsgroene kleur, uiteraard geldt dat hier voorlopig nog met enige soepelheid moet worden omgegaan. In combinatie met de blauw mutant zal er de grijze kleurslag ontstaan.

De grijs factor vererft autosomaal dominant.

Zie verder ook de groen en de Java.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet turquoise:**

Door de turquoise factor reduceert het carotenoïde, zowel het rood als geel. Hierdoor wordt de lichaamskleur zeegroen van kleur. Door het restant rood en de blauw structuur zien we nog een lila/roze borstkleur. De bovensnavel van de man blijft gewoon dieprood. Ook de zwarte veervelden, worden niet aangetast. Speciaal gelet dient er op te worden dat de kleur egaal is en niet vlekkelig.

De turquoise vererft autosomaal recessief, maar is wel co – dominant over blauw.

Zie ook groen en Java.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet blauw:**

Bij de blauw mutant is al het carotenoïde geheel verdwenen. De lichtgroene veervelden worden hemelsblauw, de groene blauw en de donkere veervelden kobaltblauw. De borstkleur is licht lila door het nog aanwezige blauw structuur en zwart melanine. De vleugelbocht toont wel een witte bocht. De tekening's velden moeten wel strak zijn afgelijnd. De lichaamskleur moet ook zo egaal mogelijk en niet vlekkelig overkomen. Vaak zien we wat zwarte omzoming, vooral op het rug – en vleugeldek, dit is een kleurfout en wordt veroorzaakt door het afknagen van de toppen van de veertjes.

De blauwe vererft autosomaal recessief.

Zie ook de groen en Java.

#### 4c. Alexander parkieten

##### Algemeen:

Van de Alexander parkieten zijn er 4 ondersoorten bekend, die qua formaat, grote van de snavel, grote van de schouderplek, breedte van de nekband en kleurdiepte van elkaar verschillen. Hiervan zijn er 2 in deze standaard opgenomen, de andere 2 komen zo ver wij weten niet voor bij de kwekers in Europa en/of de onderlinge verschillen zijn te minimaal. Door onwetendheid zijn door kwekers diverse ondersoorten regelmatig door elkaar gekweekt, daarom vragen we bij de mutanten maat 1 vorm, welke we in feite wetenschappelijk (*Psittacula eupatria domestica*) zouden kunnen noemen. De toevoeging *Domestica* geeft aan dat het hier om een geselecteerde vorm gaat. Tevens is deze keuze gemaakt om de wildkleur en ondersoorten fokzuiver te houden.

Alexander parkieten komen uit Zuidoost Azië.

De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

##### **Grote Alexander parkiet (*Psittacula eupatria eupatria*) Linne 1766**

Dit is de nominatvorm en komt voor in het Zuiden van India en Sri Lanka.

Mannen hebben een grotere en plattere kop, dit geldt ook voor de ondersoorten. De kleur is bij de grote Alexander het helderste groen. De roze nekband is op het breedste punt zo 5 mm breed.

Formaat: 58 cm, poppen zijn iets kleiner door een kortere staart.

Ringmaat: 8 mm.

##### **Nepalese Alexander parkiet (*Psittacula eupatria nippalensis*) Hodgson 1836**

De Nepalese Alexander parkiet is duidelijk veel groter dan de grote Alexander parkiet, ook de snavel is groter en zwaarder dan bij de nominatsoort. De roze nekband is dieper en breder (8 mm) en ook de schouderplek is dieper en groter. De lichaamskleur is matter, meer grijsgroen. Het blauw in de nek is sprekerder.

Verspreidingsgebied is Oost Afganistan, Pakistan, Centraal en Noord India, Nepal, Bangla Desh en Bhutan.

Formaat: 64 tot 70 cm, poppen iets kleiner.

Ringmaat: 8,5 mm.

##### **Laos Alexander parkiet (*Psittacula eupatria siamensis*) Kloss 1917**

Dit is met zijn 55 cm de kleinste ondersoort en valt direct op door zijn zeer smalle hals – en nekband. Ook de schouderplek is kleiner. Het rug – en vleugeldek is vrij heldergroen, maar de hals, achternek, borst en wangen zijn flink bewaasd. De poten zijn lichter van kleur.

Verspreidingsgebied is Vietnam, Cambodja, Laos en Noordwest Thailand.

Formaat: 55 cm

Ringmaat: 8 mm

Niet omschreven ondersoorten zijn:

##### **Andamen Alexander parkiet (*Psittacula eupatria magnirostris*) Ball 1872**

Deze ondersoort wordt niet gehouden in Europa zover we weten. Hij valt op door zijn grote plompe snavel en groot formaat, gelijk aan de Nepalese ondersoort, wel is de Andamen helderder van kleur, ongeveer gelijk als de nominatvorm, alleen de borst en buik hebben een lichtgrijze waas. Het blauw in de nek is dieper maar ook minder verspreid.

Verspreidingsgebied alleen op de Andamen Eilanden.

Formaat: 62 cm, poppen iets kleiner.

Ringmaat: 8,5 mm

##### **Birma Alexander parkiet (*Psittacula eupatria avensis*) Kloss 1917**

Komt erg veel overheen met de nominatvorm, de verschillen zitten voornamelijk dat de halsband smaller is en de nekband (het roze) lichter is. Ook het blauw in de nek is lichter.

Verspreidingsgebied is Assam en Birma.

Formaat 58 cm

Ringmaat: 8 mm

## **Fysieke standaard van de Alexander parkieten:**

### **Conditie:**

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben, zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

### **Formaat:**

Deze staat per (onder) soort apart vermeldt, de staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

### **Model:**

Een ideale Alexander parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot aan de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

### **Houding:**

De Alexander parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij van het hout zit.

De dijnen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

### **Kop:**

De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel (vooral bij de mannen). De snavelbasis is breed. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

### **Poten:**

Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

### **Snavel:**

De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

### **Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is relatief lang, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaartdekveren.

<b>Kleurslag</b>	<b>Man: Grote Alexanderparkiet 56 cm</b>	<b>Pop: Grote Alexanderparkiet 56 cm</b>	<b>Man: Nepalese Alexanderparkiet 64 tot 70 cm</b>	<b>Pop: Nepalese Alexanderparkiet 64 tot 67 cm</b>	<b>Man: Laos Alexanderparkiet 55 cm</b>	<b>Pop: Laos Alexanderparkiet 53 cm</b>
<b>Formaat:</b>						
<b>Kleur:</b>	<b>groen</b>					
Voorhoofd en Wangen en achterkop	Helder lichtgroen Groen iets bewaasd, boven de nekband iets blauwe waas	Iets donkerder dan bij man	Groen Groen met grijze waas, boven de nekband een blauwe waas	Iets donkerder dan bij man	Heldergroen Gelijk aan wangen, boven de nekband een lichtblauwe waas	Iets donkerder dan bij man
Hals en borst.	Groen, met licht grijze waas.	Groen, met zeer lichtgrijsachtige waas.	Groen, met blauwgrijze waas	Groen met grijze waas	Groen met grijze waas	Gelijk aan man
Buik	Egaal lichtgroen	Egaal lichtgroen	Egaal groen	Egaal groen	Egaal groen	
Mantel en onderrug	Groen met iets blauwgrijze waas.	Gelijk aan man	Groen met iets grijze waas.	Gelijk aan man	Donkergroen met grijze waas	Gelijk aan man
Stuit	Heldergroen		Groen		Helder diepgroen	
Hand - en armpennen	Grijszwart, buiten vlag diepgroen, binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Grijszwart, buiten vlag diepgroen, binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Grijszwart, buiten vlag diepgroen, binnen vlag zwartgrijs	Gelijk aan man
Binnenzijde	Geelgroen		Geelgroen		Geelgroen	
Vleugel dekveren	Groen iets bewaasd.	Gelijk aan man	Groen iets bewaasd	Gelijk aan man	Donkergroen iets bewaasd	Gelijk aan man
Duimveertjes	Groen		Groen		Donkergroen	
Middelste staartpennen	Heldergroen overgaand in blauw, met aan de toppen een geelgroene punt	Gelijk aan man	Groen overgaand in blauw, met aan de toppen een geel-groene punt	Gelijk aan man	Diepgroen overgaand in diep blauw, met aan de toppen een geelgroene punt	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Heldergroen Geel	Gelijk aan man	Groen Geel	Gelijk aan man	Diepgroen Geel	Gelijk aan man
Bovenstaart dekveren	Heldergroen	Gelijk aan man	Groen	Gelijk aan man	Helder diepgroen	Gelijk aan man
Snavel	Dieprood met iets lichte punt. Ondersnavel rood	Gelijk aan man	Dieprood met iets lichte punt. Ondersnavel rood	Gelijk aan man	Rood met iets lichte punt. Ondersnavel rood	Gelijk aan man
Snavelrand	Bleek	Bleek	Bleek	Bleek	Bleek	Bleek
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Vleeskleurig	Grijs
Nagels	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Ogen	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring	Gelijk aan man	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring	Gelijk aan man	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring	Gelijk aan man
<b>Tekening:</b>						
Keel	Zwart, onderzijde smalle bleek lichtgroene streep	n.v.t. Grijs	Zwart, onderzijde smalle bleek groene streep	n.v.t. Grijs	Zwart, kleiner als bij andere soorten, onderzijde bleekgele streep	n.v.t. Grijs
Teugelstreep	Grijs		Diepgrijs		Donkergroen	
Halsband	Zwart	Vaag dof grijs/bruin	Zwart	Vaag dof grijs/bruin.	Zwart, smaller dan bij andere soorten	Vaag dof grijs/bruin.
Nekband	Roze (5 mm)	Op de plaats van het roze van de man nu helder lichtgroen	Diep roze (8 mm)	Op de plaats van het diep roze van de man nu helder groen	Zacht roze (3 mm)	Op de plaats van het zacht roze van de man, nu helder groen
Schouderplek	Donkerrood	Donkerrood	Diep donkerrood	Diep donkerrood	Donkerrood. Kleiner dan bij andere soorten	Gelijk aan man
Grote vleugelpennen	Fijne crème omzoming	Fijne crème omzoming	Fijne crème omzoming	Fijne crème omzoming	Fijne crème omzoming	Fijne crème omzoming
Vleugelbocht	Geel	Geel	Geel	Geel	Geel	Geel

**Mutanten: Grote Alexanderparkieten**

Kleurslag	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man +Pop:
Kleur:	Blauw	Blauw	Lutino	Lutino	Albino
Voorhoofd Wangen en nek	Hemelsblauw Blauw met grijze waas	Gelijk aan man iets doffer	Diep geel Geel met witte waas	Geel met een witte waas, in de nek dieper geel	Smetteloos wit
Hals en borst	Blauw met lichtgrijze waas. Egaal blauw	Gelijk aan man, iets doffer	Geel met witte waas	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Buik			Egaal geel		
Mantel en onderrug	Blauw met grijze waas	Gelijk aan man	Zacht geel met witte waas	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Stuit	Hemelsblauw		Geel		
Hand -en armpennen	Grijszwart, buiten Vlag diep blauw, binnenvlag zwartgrijs. Wit met blauwe waas	Gelijk aan man	Wit. Buitenvlag zachtgeel, binnen vlag wit Geel	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Binnenzijde					
Vleugel dekveren	Blauw met iets grijze waas Blauw	Gelijk aan man	Diep geel met iets witte waas Diepgeel	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Duimveertjes					
Middelste staartpennen	Hemelsblauw overgaand in diep blauw. De toppen wit	Gelijk aan man	Diepgeel over-gaand in zacht- geel. De toppen wit over	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Overige staartpennen en	Hemelsblauw	Gelijk aan man	Geel	Gelijk aan man	Smetteloos wit
onderstaart dekveren	Blauw grijsachtig wit		Diepgeel		
Bovenstaart dekveren	Hemelsblauw	Gelijk aan man	Diepgeel	Gelijk aan man	Smetteloos wit
Snavel	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood	Gelijk aan man	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood	Gelijk aan man	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood
Snavelrand	Bleek	Bleek	Bleek	Bleek	bleek
Poten	Grijs	Grijs	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels	Grijs	Grijs	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Ogen	Zwart met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring	Gelijk aan man	Rood met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring	Gelijk aan man	Rood met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring
<b>Tekening:</b>					
Keel	Zwart, onderzijde witte rand	n.v.t.	Wit	n.v.t.	n.v.t. , door andere structuur van de veer wel vaag wit waarneembaar
Teugelstreep	Grijs	Grijs	Donkergeel	Donkergeel	Zie keel
Halsband	Zwart	Vaag dof grijs/blauw	Wit	Vaag diepgeel	Zie keel
Nekband	Wit (7mm)	Op de plaats van het wit bij de man nu helder hemelsblauw	Diep roze (7 mm)	Op de plaats van het diep roze van de man nu okergeel	n.v.t.
Schoudervlek	Lichtgrijs	Grijs	Diep roze	Diep roze	n.v.t.
Grote vleugelpennen	Fijne witte omzoming	Fijne witte omzoming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht	Wit	Wit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dienen te worden bestraft.

Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn.

Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleuren bij de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Waar wel op bestraft dient te worden is wanneer vooral het vleugel en rugdek een zwarte omzoming tonen, dit wordt veroorzaakt door het afknagen van de veertoppen en is op de eerste plaats een bevedering fout, wat echter ook een vlekkerige kleur veroorzaakt. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keeltekening en de halsband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is matter van kleur, dient wel zo egaal mogelijk van rug –en vleugeldek te zijn. De schouderdek dient donkerrood te zijn en strak afgelijnd, aan de onderzijde hiervan moet hier enige soepelheid aan worden gegeven. Een vlekkerige of niet complete en te kleine schouderdek dient streng gestraft te worden, bij tekening, dit duidt op hybride kenmerken met de halsband parkiet. Hybride's hiervan zijn vooral te herkennen aan de vage schouderdek, ook is het formaat/model bijna altijd een tussenvorm evenals de snavelvorm. Dit moet zeer streng bestraft worden, met een maximaal van 85 punten.

Regelmatig zien we Grote Alexander parkieten die groter zijn dan 58 cm, tot aan 60 cm mits de juist gevraagde kleur en tekeningsomschrijving dit niet bestraffen, worden ze echter groter dan keuren als Nepalese Alexander en bestraffen aan de hand van de standaard hiervan. Poppen zijn gelijk van model, alleen iets kleiner van formaat door een iets kortere staart. Ook zijn ze in het geheel matter van kleur.

Mannen krijgen pas in het derde levensjaar hun volledige kleur en nekband, indien U mannen aantreft welke een gedeeltelijke nekband tonen, moet dit bestraft worden bij tekening.

Mannen worden gekeurd in schaal 1 en poppen in schaal 2.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Nepalese Alexander parkiet**

Het grootste verschil met de nominaatvorm is het formaat, wat wel 10 cm kan verschillen. Hier moet dan ook duidelijk verschil in zijn. Ook de bovensnavel is veel forser van vorm. Het roze in de nek is veel dieper en breder, evenals de schouderdek. De lichaamskleur is ook veel meer bewaasd, met een grijsgroenachtige kleur, vooral in de wangen, rug/mantel en borst. Alleen het voorhoofd is helder lichtgroen van kleur. De lichaamskleur moet wel zo egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. De schouderdek moet strak zijn afgelijnd, vooral aan de bovenzijde, de onderzijde moet hierin met enige soepelheid beoordeeld worden. Zie ook K.T.A. van de Grote Alexander parkiet

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Laos Alexander parkiet**

De Laos Alexander parkiet is nog een zeer zeldzame verschijning binnen Europa, toch komt hij al wel hier voor, vandaar de reden om hem in deze standaard te doen opnemen. Hij valt direct op door zijn klein formaat en toch vrij grove snavel. Ook de nek –en halsband zijn opvallend smal en mogen hierop niet bestraft worden, dit is een typisch kenmerk van de Laos. Ook de schouderdek is kleiner en helderder rood.

Verder gelijk aan Grote Alexander parkiet.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: MUTATIES: Grote Alexander parkiet**

Hierin worden niet de ondersoorten apart gevraagd, maar alleen de nominaatvorm, groter door inkweek van de Nepalese is toegestaan.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet blauw:**

Bij de blauw mutatie is al het gele en rode carotenoïde verdwenen, hierdoor ontstaat de blauwe. Het oorspronkelijke zwart bezit wordt niet aangetast. De grijze waas zoals die bij de (wildvorm) verlangd wordt moet ook bij de blauwe aanwezig zijn. De kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. De kopkleur is het diepst blauw. De halsband dient strak afgelijnd te zijn, evenals de witte nekband. De schouderdek is grijs van kleur en moet ook zo egaal mogelijk zijn. De snavelkleur is rood gebleven.

Speciaal gelet moet er worden op formaat en model en de fok zuiverheid, dat er geen halsband parkiet zichtbaar zijn. Dit is vooral te zien aan de kop/snavelvorm en de grote van de schouderdek.

Poppen zijn in het geheel matter van kleur.

De blauw factor vererft autosomaal recessief.

Zie ook K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet lutino**

Bij de lutino is al het zwart melanine en blauwstructuur verdwenen, hierdoor ontstaat er een gele vogel. Ook de oogkleur is gemuteerd, deze is nu rood. Sterk dient er op worden gelet op model en formaat, het moet een volle vogel zijn en de borst mag niet ingevallen zijn. De lichaamskleur is niet geheel egaal geel, waar

oorspronkelijk een grijze waas aanwezig was is dit nu wit bewaasd. Er mag geen groene waas zichtbaar zijn. Alleen het voorhoofd, buik, stuit en staart zijn diep egaal geel. De vleugelpennen zijn wit met een zachtgele waas, wel geniet de diepst gekleurde de voorkeur. De rode schouderplek dient ook zo strak mogelijk te zijn afgelijnd en ook van juiste grote zijn, wel moet hier enige soepelheid toe gepast worden, vaak zie op het vleugeldek ook nog wat rood, dit wordt bij de (wildkleur) gemaskeerd. Wel geniet de strakst afgelijnde de voorkeur. De halsband bij de man is wit. De koptekening van de man dient zo strak mogelijk te zijn. Ook moet de lichaamskleur bij zowel man als pop schoon zijn zonder vuile aanslag. Ook hier moet streng gelet op worden, dat de vogel zuiver is en geen halve hybride.

De lutino vererft geslachtsgebonden recessief.

Zie ook de K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen

#### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet albino**

De albino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos wit zijn zonder enige vuile aanslag. Soms toont een albino een blauwe of grijze aanslag, dit is een kleurfout. De staart dient volledig en smetteloos wit te zijn.

Door de vederstructuur zien we voornamelijk bij de mannen een vage witte halsband, deze mag niet een bruine waas tonen dat is een kleurfout.

De albino is een combinatie van de blauwe en lutino mutant

Zie ook de K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen

#### **Noot 1:**

Bij zowel de lutino en albino zien we al regelmatig Grote Alexander parkieten welke nog een vage keeltekening tonen, ook de lichaamskleur is meer gebroken wit bij de albino.

Het betreft hier een combinatie vogel, waarvan nog niet met 100% zekerheid vast is gesteld of dit de misty of recessief grijs factor is in combinatie met de ino factor.

Wanneer U dit soort vogels ter keuring krijgt voorlopig keuren als mutant en het aanwezig zijn van de keeltekening bij een man mag niet bestraft worden

#### **Noot 2:**

Niet beschreven en of bewezen, maar al wel ontstaande mutaties/kleuren zijn bij de Grote Alexander parkieten Grijsgroen, donkergroen of violet factorig, cinnamon, pale fallow, misty, turquoise, bont en de gezoomde, deze laatste kan ook de spangle zijn

Deze zijn nog zo zeldzaam en van een aantal nog geen mannen geheel op kleur, dat het nu nog te vroeg is om ze nu al te doen opnemen in deze standaard. Zodra het aantal toeneemt en er meer gegevens over bekend zijn kan dit alsnog gebeuren.

**4d: Rozekop parkiet - Grijskop Edelparkiet –Pruimkop parkiet – Rothschild's parkiet:**

**Algemeen:**

Hoewel het hier om vier aparte soorten gaat,zijn de overeenkomsten zo groot,dat we ze voor een goede duidelijk overzicht toch bij elkaar geplaatst hebben. Vroeger werd de Rozekop als ondersoort van de pruimkop gezien en de Rothschild's als een hybride van de Grijskopedel en de Pruimkop. Gezien de grote overeenkomsten was dit niet vreemd,nu echter worden ze als aparte soort ,binnen het *genus Psittacula* omschreven. De soorten worden eerst ieder apart met eventuele ondersoorten algemeen omschreven en voor de fysieke standaard geldt dit voor alle vier de soorten tegelijk.

**Rozekop parkiet ( *Psittacula roseata roseata*) Biswas 1951**

Verspreidingsgebied Noord Birma,Assam,,Oost Pakistan en Bangla Desh. Er is 1 ondersoort de Birma rozekop parkiet

De Rozekop parkiet lijkt erg veel op de Pruimkop parkiet,de rozekop is het duidelijkste verschil ,ook missen ze de blauwe waas in de nek. De lichaamskleur is wat lichter en de toppen van de staart,welke iets korter zijn, is geel i.p.v. wit zoals bij de Pruimkop parkiet. Ook het formaat is een stuk kleiner dan de Pruimkop parkiet. Zowel man als pop bezitten de schouderplek,deze is ook iets groter dan bij de Pruimkop parkiet.

De pop is iets kleiner door een kortere staart lengte.

Tot zover bekend zijn er nog geen mutaties bekend van de Rozekop parkiet,er gaan geruchten dat er een lutino zou zijn ontstaan,maar wij denken dat het hier om een lutino Grijskop edelparkiet gaat.

Formaat: 30 cm ,poppen 28 cm

Ringmaat: 5,5 mm

**Birma rozekop parkiet (*Psittacula roseata juneae*) Biswas 1951**

Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Zuid Assam,Birma,Thailand,Laos,Cambodja en Vietnam is niet in deze standaard opgenomen,gezien de minimale verschillen,met de nominaatvorm.

Het verschil is dat ze in het geheel iets lichter zijn, en de schouderplek iets groter is.

**Grijskop edelparkieten:**

**Himalaya grijskop edelparkiet (*Psittacula himalayana himalayana*) Lesson 1832**

Dit is de nominaatvorm en heeft als verspreidingsgebied Zuidoost Azie,vanaf oostelijk Afganistan door Pakistan en Noordelijk India tot Nepal. Er is 1 ondersoort bekend.

Heeft zoals de naam al zegt een grijze kop,wordt door sommige ook wel foutief zwartkop parkiet genoemd. Lijken verder veel op de Pruimkop parkiet,zijn wel groter van formaat door de lange staart. Opvallend bij de grijskop parkieten is de staartkleur,deze is op het uiteinde zo 7 cm geel en is wordt ook weer wat breder op het einde.

Poppen zijn wat doffer van kleur en missen de schouderplek.

Formaat: 40 cm

Ringmaat: 6,5 mm

**Finch's Grijskop edelparkiet ( *Psittacula himalayana finchii*) Hume 1874**

Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Nepal naar Thailand,Birma,Vietnam en Zuidwest China,heeft toch opvallende verschillen t.o.v. de nominaatvorm en is derhalve ook in deze standaard opgenomen.

De Finch's is een stuk kleiner van lichaam ,maar door een veel langere staart dan de nominaatvorm gelijk van lengte (40 cm ). Het uiteinde van de staart wordt ook niet breder en is vuilwit/bleekgeel i.p.v. geel van kleur. Ook de snavelkleur is dieper. Ook hier missen de poppen de schouderplek.

Formaat: 40 cm

Ringmaat: 6 mm

**Pruimkop parkiet (*Psittacula cyanocephala*) Linne 1766**

De Pruimkop parkiet is wel de bekendste en meest gehouden,binnen deze groep en heeft als verspreidingsgebied Sri Lanka,Rameswaram Eiland,India,Oost Pakistan en vanaf Nepal tot aan Bhutan. Er zijn geen ondersoorten van de pruimkop parkiet.

De man valt direct op met zijn "pruimrode" kopkleur,deze is bij de pop grijs. De toppen van de staart zijn bij beide geslachten wit.de pop is wat doffer van kleur en mist de zwarte nekband,blauwe waas en schouderplek.

Van de pruimkop parkiet zijn er diverse mutaties opgetreden,warvan er al een aantal in deze standaard zijn opgenomen.

Formaat: 34 cm ,poppen 33 cm

Ringmaat: 5,5 mm

**Rothschild's parkiet ( *Psittacula intermedia*) Rothschild 1895**

Over het bestaan van deze soort, heeft heel wat stof doen opwaaien. Er wordt door een aantal beweerd dat het hier om een hybride zou gaan tussen de Pruimkop parkiet en Grijskop edelparkiet. Door proefparingen op te zetten van deze twee soorten is gebleken dat de Rothschild's wel degelijk een aparte soort is. De Rothschild's heeft namelijk zowel een gele boven als ondersnavel kleur en bij hybride's is de ondersnavel altijd zwart van kleur. Het verspreidingsgebied is wel overlappend van eerder genoemde soorten n.l. Noord India. De kopkleur is grijs met een paarse waas en een opvallend rood voorhoofd. Bij poppen is de rode kleur minimaal aanwezig, wel bezitten zowel man als pop een nekband. De pop mist de schouderplek, hoewel, net als bij de roze kop en pruimkop poppen nog regelmatig een vage vlek te zien is.

Formaat: 36 cm

Ringmaat: 5.5 mm

**Fysieke standaard van de Rozekop -, Grijskopedel -, Pruimkop –en Rothschild's parkiet**

Wij verwijzen U hier naar de fysieke standaard van de Afrikaanse halsband parkiet, deze is geheel gelijk, op het formaat na. Dit kunt U terug vinden bij algemeen en bij de standaard zelf .

## Rozekop –en Grijskop Edelparkieten

Kleurslag	Man: Rozekop parkiet	Pop: Rozekop parkiet	Man: Himalaya grijskop Edelparkiet 40 cm	Pop: Himalaya grijskop Edelparkiet 40 cm	Man: Finch's grijskop Edelparkiet 40 cm	Pop: Finch's grijskop Edelparkiet 40 cm
<b>Formaat:</b>	<b>30 cm</b>	<b>28 cm</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>
<b>Kleur:</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>	<b>groen</b>
Kop	Roze, achterkop meer lila	Grijs, met iets lila waas	Helder donkergrijs blauwe schijn	Donkergrijs	Donkergrijs	Gelijk aan man
Nek	Egaal helder lichtgroen	Geelgroen	Egaal helder lichtgroen	Egaal helder lichtgroen	Groen met gele waas	
Hals en borst. Buik en onderlijf	Egaal helder lichtgroen	Egaal lichtgroen, iets matter dan bij man	Lichtgroen	Lichtgroen	Groen met gele waas	Gelijk aan man
Mantel en onderrug	Groen, iets bewaasd	Gelijk aan man, iets doffer	Groen iets gele waas	Groen met iets bruine waas	Donker geelgroen met bruine waas	Gelijk aan man ,iets doffer
Stuit	Helder lichtgroen		Groen	Groen	Groen	
Hand - en armpennen	Grijszwart overgaand in diep groene toppen, buitenvlag diepgroen, binnen vlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Grijszwarte boven-rand, verder diep-groen, buitenvlag diepgroen, binnen-vlag zwartgrijs	Gelijk aan man ,iets donkerder	Donkergroen met grijszwarte toppen. Buitenvlag donkergroen ,binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man
Vleugel dekveren	Groen iets omzoomd	Gelijk aan man	Groen iets omzoomd	Groen iets bruine waas	Groen met bruine waas	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Heldergroen overgaand in diep blauw met gele toppen	Gelijk aan man, iets minder diep blauw	Kobaltblauw, half weg overgaand in geel (7 cm)	Diep kobaltblauw ,halfweg overgaand in geel	Violet, overgaand in zachtgeel/vuilwit, de toppen weer dieper geel	Gelijk aan man
Overige staartpennen en	Lichtgroen overgaand in blauwe waas met gele toppen.	Gelijk aan man	Groen ,met brede gele rand en toppen	Diepgroen ,met brede gele rand en toppen	Groen met gele toppen	Gelijk aan man
Onderstaart dekveren	Groen		Groen	Groen	Geelgroen	
Bovenstaart dekveren	Helder lichtgroen	Gelijk aan man	Groen	Diepgroen	lichtgroen	Gelijk aan man
Snavel	Okergeel met iets donkere punt, ondersnavel zwart	Bleekgeel met iets donkere punt, ondersnavel donkergrijs	Oranjerood met gele punt, ondersnavel geel. Hoornkleurig	Licht oranjerood met gele punt, ondersnavel geel. Hoornkleurig	Oranjerood met gele punt. Ondersnavel geel	Okergeel met gele punt. Ondersnavel geel
Snavelrand/ neusdop	Bleek	Bleek			Hoornkleurig	Hoornkleurig
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Ogen	Zwart, met bleekgele iris	Gelijk aan man	Zwart, met flets gele iris	Gelijk aan man	Zwart, met flets gele iris	Gelijk aan man
<b>Tekening:</b>						
Keel	Zwart	n.v.t.	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Nekband	Zwart, aan kopzijde een lila rand vanaf de snavel	Okergele rand	Zwart, onderzijde een zeegroene rand	Zwart	Zwart, onderzijde een helder zeegroene rand	Zwart
Schoudervlek	Bruinrood	Bruinrood	Bruinrood	Geen, soms vaag waarneembaar, geen heeft voorkeur.	Bruinrood	n.v.t.
Slagpennen	Fijne bleekgele omzoming	Fijne bleekgele omzoming	Fijne bleke omzoming	Fijne bleke omzoming	Fijne lichtgroene omzoming	Fijne lichtgroene omzoming

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Rozekop parkiet:**

De rozekop parkiet komt men nog niet veelvuldig tegen op tentoonstellingen. Ze lijken erg veel op de pruimkop parkiet, met een roze i.p.v. een paarsrode kopkleur. Ze zijn ook wat kleiner van formaat, dan de pruimkop, hier moet dan ook rekening mee worden gehouden. Dit wil niet zeggen dat het model ook automatisch minder is, dit moet een volle indruk geven en ook de houding moet recht van ruglijn zijn. De kleur is helderder groen dan bij de pruimkop en de rozekop mist de zeegroene kleur in de nek, dit is heldergroen. Ook de staarttoppen zijn bij de rozekop geel, welke bij de pruimkop wit van kleur zijn. De pop is iets kleiner van formaat, mist de zwarte nekbands en de kopkleur is grijs met iets lila was. Poppen bezitten wel de bruinrode schouderplek.

Evenals bij alle Edelparkieten moet er goed op de nagels gelet worden, of deze alle aanwezig zijn.

Jonge vogels hebben een groengrijze kopkleur, geen gele hals/nek zoals bij de pruimkop, een kortere staart en nog geen schouderplek. Vaak komen er na de jeugdruï al wel enkele rode veertjes hier door, maar pas na twee jaren komen ze volledig op kleur.

Tot zo ver bekend zijn er nog geen mutanten van de rozekop parkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Himalaya grijskop edelparkiet:**

Ook deze soort is geen alledaagse verschijning op een tentoonstelling. Ze zijn een stuk groter dan een pruimkop parkiet, door een langere staart. Man en pop bezitten beide een grijze kop en zwarte nekbands, ook zijn ze gelijk van formaat. De pop is wat doffer van kleur en mist de schouderplek, indien dit iets aanwezig is moet dit bestraft worden bij kleur, toont tekening waar kleur dient te zitten. Ook is de snavelkleur wat lichter bij de pop. Opvallend kenmerk van de nominatform t.o.v. de ondersoort Finch's is dat het uiteinde van de gele staarttoppen weer wat breder worden.

Jonge vogels hebben een groene kop met wat grijs en de staart is korter.

Verder gelijk aan andere Edelparkieten.

Er zijn nog geen mutaties bekend bij de Himalaya grijskop Edelparkiet.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Finch's grijskop edelparkiet:**

Deze ondersoort van de Himalaya grijskop Edelparkiet, lijkt erg veel op de nominatform, maar is een stuk kleiner van lichaam, maar door een langere staart is de totale lengte precies hetzelfde. De staart van de Finch's is smaller en wordt niet breder op het uiteinde. Ook de kleur is anders bij de Finch's is de overgang van violet naar vuilwit en de toppen geel, bij de Himalaya is dit van kobalt naar geel. De algemene lichaamskleur is wat meer geelgroen en de zeegroen nek is wat lichter. Poppen zijn wat fletser/doffer van kleur en missen de schouderplek.

Jonge vogels hebben nog geen grijze kop, die krijgen ze na het eerste jaar, de staart is korter en de snavel hoornkleurig, een iets gele snavel duidt vaak op een jonge man.

Na twee jaar zijn ze volledig op kleur.

Er is 1 mutant bekend van de Finch's grijskop Edelparkiet de recessief lutino, deze is nog zo zeldzaam, dat er nog geen standaard van gemaakt kan worden. Opvallend is wel dat bij deze lutino de kop lichtroze is met een witte keel en dat de gehele bovenstaart een rode was toont op het gele topje na. Hij moet zeker ook opvallen door zijn zeer lange staart.

Verder gelijk aan andere edelparkieten.

## Pruimkop parkieten

Kleurslag Formaat:	Man: 34 cm	Pop: 33 cm	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur:	Groen	Groen	grijsgroen	grijsgroen	cinnamon	cinnamon
Kop	Paars/rood, achterkop meer paars	Grijs met blauwe waas Olijfgroen, met gele waas	Diep rood, achterkop, grijs bewaasd. Lichtgrijsgroen	Grijs	Helder paars/rood, achterkop met paars	Lichtgrijs
Nek	Turquoise			Grijsgroen	Geelgroen	Groen met bruine waas
Hals en borst	Geelgroen	Olijfgroen	Grijsgroen	Grijs/geelgroen	Diepgeelgroen	Lichtgroen
Buik en onderlijf	Groen	Groen	Olijfgroen	Olijf/geelgroen	Geelgroen	Geelgroen
Mantel /onderrug	Geelgroen iets bewaasd Groen	Olijfgroen met gele waas Groen	Grijsgroen met grijze waas Grijsgroen	Gelijk aan man, iets doffer	Geelgroen met bruine waas. Zeegroen	Gelijk aan man, iets doffer
Stuit						
Hand - en armpennen	Donkergroen naar de toppen overgaand in zwartgrijs	Gelijk aan man	Grijsgroen, naar de toppen overgaand in zwartgrijs	Gelijk aan man	Groen, naar toppen overgaand in bruingrijs	Gelijk aan man
Vleugel dekveren	Diepgroen	Gelijk aan man	Grijsgroen	Gelijk aan man	Bij schouders zeegroen, overgaand in groen met bruine waas	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Diep kobaltblauw, met witte toppen	Gelijk aan man	Zwartgrijs met crèmekleurige toppen	Gelijk aan man	Kobaltblauw, met grijze waas. Buitenzijde lichter, de toppen crèmekleurig	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Groen, met gele toppen Lichtgroen	Gelijk aan man	Grijsgroen, met gele toppen Geel/grijsgroen	Gelijk aan man	Lichtgroen met gele toppen Geelgroen	Gelijk aan man
Bovenstaart dekveren	Lichtgroen	Gelijk aan man	Grijsgroen	Gelijk aan man	Geelgroen	Gelijk aan man
Snavel	Okergeel, onder snavel bruinzwart	Bleekgeel, onder snavel grijs	Okergeel, onder snavel bruinzwart	Bleekgeel, onder snavel grijs	Okergeel, onder snavel bruin	Bleekgeel, onder snavel bruingrijs
Snavelrand/neusdop	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Bruin	Bruin
Ogen	Zwart, iris geel/wit	Zwart, iris geel /wit	Zwart, iris geel/wit	Zwart, iris geel/wit	Donkerbruin, iris geel/wit	Donkerbruin, iris geel/wit
Tekening:						
Keel	Zwart	n.v.t.	Zwart	n.v.t.	Zwartbruin	n.v.t.
Nekband	Zwart, onderzijde licht zeegroen	Lichtgeel	Zwart, onderzijde lichtgrijs	Geel	Zwartbruin, onder zijde lichtblauw	Geel
Schoudervlek	Roodbruin	n.v.t.	Roodbruin	n.v.t.	Helder roodbruin	n.v.t.
Vleugelpennen	Fijne lichtgroene omzoming	Gelijk aan man	Fijne lichtgrijsgroene omzoming	Gelijk aan man	Fijne geelgroene omzoming	Gelijk aan man

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet**

De pruimkop parkiet is een vrij algemene verschijning op een tentoonstelling,er moet dan ook goed op formaat en model gelet worden. lele en/of te smalle vogels moeten streng gestraft worden. Een goede conditie is een eerste vereiste om voor een hoge waardering in aanmerking te komen ,het missen van een of meerdere nagels is ook een veelvoorkomende fout. De kleur moet helder en egaal zijn en niet vlekkerig overkomen. Het vleugeldek is harder groen dan de borst en rugdek,waar een waas over zit. De zwarte nekband moet strak afgelijnd zijn en niet te smal/fijn. De schouderplek heeft de vorm van een driehoek en moet strak zijn. Poppen hebben een paarsgrijze kop en missen de zwarte nekband,wel bezit een pop een gele nekband,deze is vloeit iets over in de nek/rugdek. Poppen missen ook de schouderplek ,het iets tonen hiervan is een kleurfout.

Mannen zijn pas na het tweede jaar volledig op kleur. Jonge vogels hebben een grijsgroene kopkleur met een gele kraag in de nek en zijn veel doffer van kleur. Ook de staart is veel korter.

In sommige literatuur worden 3 ondersoorten genoemd, in andere worden deze als aparte soorten omschreven. Hier worden waarschijnlijk o.a. de rozekop en rothschild's mee bedoeld!

Zie verder ook de andere Edelparkieten.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: MUTANTEN:**

#### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet grijsgroen**

De grijsgroen wordt regelmatig foutief als olijfgroen aangeboden,een olijfgroene is een mutant met een dubbele donker factor (DD).

Dit is vrij eenvoudig te constateren de bovenzijde van de staart is bij een grijsgroene zwart en bij een DD zou dit diep blauw /mauveachtig moeten zijn. Ook is de donker factor nog niet ontstaan bij de pruimkop en is het onmogelijk om dan al een olijfgroene (DD) te kweken !

De kopkleur is dieprood,veel roder dan bij de (wildkleur) met een grijze waas in de nek,onder de zwarte nekband is de kleur grijs bewaasd.. De algemene lichaamskleur is grijsgroen,vooral rond de schouderplek is de kleur diep grijsgroen. Poppen hebben een grijze kop en zijn iets doffer van kleur. De grijsgroene is al een vrij veelvoorkomende mutant bij de kwekers,op tentoonstellingen zien we ze nog niet zo vaak.

De grijsgroen vererft autosomaal dominant.

Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten.

#### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet cinnamon**

De cinnamon factor zorgt ervoor dat het originele zwart melanine ,nu uitkleur tot bruin. Ook de onderdons wordt hierdoor bruin,wat een lichtere lichaamskleur tot gevolg heeft,inclusief de kopkleur. De keel en nekband zijn zwartbruin,de nekband moet wel aan de zelfde eisen voldoen qua vorm en breedte als bij de (wildkleur),vaak zien we dat de nekband aan de smalle kant is en niet strak.

De slagpennen moeten zo diep en egaal mogelijk bruin zijn,regelmatig zien we dat deze pennen tweekleurig en te flets zijn . dit wordt bijna altijd veroorzaakt doordat de vogels in te veel zonlicht hebben gezeten waardoor deze pennen opleken. De pop heeft een lichtgrijze kopkleur en is iets doffer van kleur.

De cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief.

Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten.

Van de Pruimkop parkiet zijn er ook de volgende mutaties ontstaan,deze zijn nog zo zeldzaam dat het voor een gerichte standaard omschrijving nog te vroeg is,gezien het feit dat er nog niet voldoende mannen volledig op kleur van zijn om al een gerichte omschrijving te maken. Het zelfde geldt voor de combinatie van grijsgroen met cinnamon..

Niet beschreven primaire mutanten zijn: recessief lutino, lutino (SL), blauw, overgoten, opaline, pastel of faded, recessief bont en de gele zwartoog. We zien ook regelmatig een uiterlijk turquoise, dit is echter tot nu toe steeds een modificatie gebleken, na het tweede jaar wordt het gewoon een (wildkleur).

Bij nieuwe kleurslagen vragen wij U dringend, dit te melden bij de keurmeestersvereniging parkieten en/of werkgroep edelparkieten.

#### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Rothschild's parkiet**

Over de Rothschild's parkiet zijn de meningen nogal verdeeld. Voor sommigen is dit een hybride van de pruimkop met de grijskop edelparkiet . Echter nakomelingen uit deze paring bezitten een zwarte ondersnavel en ook de bovensnavel is veel dieper oranje-rood. De werkgroep edelparkieten is van mening dat het hier om een zelfstandige soort gaat

Het spreekt voor zich ,dat U wanneer ze ter keuring aangeboden worden speciaal op moet letten op de fok zuiverheid. De eerder genoemde donkere snavel bij een hybride is bij de Rothschild's geel,het rood aan de kop beperkt zich hoofdzakelijk op het voorhoofd,bij een hybride zien we deze rode kleur ook het duidelijkst op het voorhoofd,maar ook op de rest van de kop laat deze een duidelijke rode waas zien. De pop mist de vleugelplek.

Er zijn zover bekend geen mutaties opgetreden bij de Rothschild's

Verder gelijk aan overige edelparkieten.

**4e: Malabar –en Layard's Parkiet**

**Algemeen:**

**Layard's parkiet (*Psittacula calthorpa*) Blyth 1849**

Verspreidingsgebied Sri Lanka. De Layard's wordt ook wel Cylon parkiet genoemd de vroegere naam voor Sri Lanka. Het is de kleinste soort binnen de *Psittacula* familie met zijn 29 cm en is erg zeldzaam binnen de vogelliefhebberij. Er zijn geen ondersoorten bekend.

Man en pop zijn nagenoeg gelijk van kleur en tekening, poppen hebben als duidelijkste verschil een zwarte snavel i.p.v. een rode bij de man en minder groen en blauw rond het oog, ook zijn ze iets donker van kleur

Formaat: 29 cm

Ringmaat: 5 mm

**Malabar parkiet (*Psittacula colomboidea*) Vigors 1830**

Verspreidingsgebied Zuidwest India. De Malabar parkiet wordt ook wel Duif parkiet genoemd. Er zijn geen ondersoorten van bekend, ondanks dat de Layard's er vrij veel van weg heeft, het grote verschil zit in het vleugeldek, dit is bij de Malabar geschubd/omzoomd en bij de Layard's zien we hier een vleugelbalk zoals we die ook zien bij de baard parkieten en Derbyan parkiet. Poppen hebben een bredere nekband en missen de zee-groene band onder de zwarte nekband. Ook de borstkleur is bij de pop grijs-groen, welke bij de man blauw-grijs is.

Formaat: 37 cm 38 cm

Ringmaat: 6,5 mm

Kleurslag	Man: Layard's Edelparkiet	Pop: Layard's Edelparkiet	Man: Malabar parkiet	Pop: Malabar parkiet
<b>Kleur:</b> <b>Formaat:</b>	<b>groen</b> <b>29 cm</b>	<b>groen</b> <b>29 cm</b>	<b>groen</b> <b>37 cm</b>	<b>groen</b> <b>37 cm</b>
Kop	Grijs ,voorhoofd en rond de ogen groen	Gelijk aan man.alleen het groen op het voorhoofd is donkerder	Diep blauwgrijs,voorhoofd en rond het oog lichtgroen	Grijs,minimaal groen bij het oog
Nek	Smaragdgroen			
Hals en borst	Smaragdgroen	Gelijk aan man,iets lichter	Blauwgrijs	Hals grijs,borst grijsgroen, buik lichtgrijsgroen
Buik ,onderlijf	Groen		Geelgroen met blauwe waas	
Mantel en onderrug	Blauwgrijs	Gelijk aan man	Blauwgrijs	Grijs,minder dan bij man
Stuit	Kobaltgrijs		Zeegroen	Zeegroen
Hand - en armpennen	Groen met grijszwarte toppen. Buitenvlag groen,binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Kobaltblauw met zwartgrijze toppen	Gelijk aan man
Vleugel dekveren	Groen,bij schouders donkergroen	Donkergroen	Donkergroen,bij schouders kobalt/mauve	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Diep kobaltblauw met bleekgele punt	Gelijk aan man	Blauw met gele punt	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Kobaltblauw met groene buitenvlag	Gelijk aan man	Groen,met gele punt en buitenvlag	Gelijk aan man
Bovenstaart dekveren	Kobaltblauw met grijze waas	Gelijk aan man	Geel	Gelijk aan man
Snavel	Kobaltblauw met gele punt. Ondersnavel zwart	Zwart	Zeegroen	Gelijk aan man
Snavelrand/neusdop	Oranjerood met gele punt.	Zwart	Rood met iets gele punt,ondersnavel zwart met rode waas	Zwart
Poten	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Nagels	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs
Ogen	Grijs	Grijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
<b>Tekening:</b>	Zwart met flets gele iris	Zwart met flets gele iris	Zwart met gele iris	Zwart met gele iris
Keel (baard)	Zwart	Zwart	n.v.t.	n.v.t.
Voorhoofdband	n.v.t.	n.v.t.	Blauw/violet	
Nekband	Zwart	Zwart	Zwart,onderzijde een lichtzeegroene band	Zwart
Hals	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Schoudervlek	Geelgroen	Geelgroen,iets helderder dan bij man	n.v.t.	n.v.t.
Vleugeldek	Duidelijke lichtgroene omzoming	Gelijk aan man	Scherpe bleekgele omzoming	Gelijk aan man
Vleugelpennen	Fijne lichtgroene omzoming	Gelijk aan man	Buitenvlag groen omzoomd	Minimale omzoming

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Layard's parkiet**

De Layard's parkiet is nog zo zeldzaam dat we ze nog zelden op een tentoonstellingen zullen mogen aanschouwen. Hoofdzakelijk betreft het dan hier ook dan om een conditie keuring. De kleur moet wel zo diep mogelijk zijn en egaal . De nekband is vager en smaller dan bij de Malabar parkiet vooral achter in de nek. Het smaragdgroen in de nek is even diep als op de borst. De geelgroene vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd,onder deze vleugelbalk zijn de dekveren lichtgroen omzoomd. Poppen zijn gelijk aan de man ,hebben alleen een zwarte snavel i.p.v. een rode en het vleugeldek is iets donkerder. Poppen hebben ook minder groen rond de snavel en een iets kleinere kop,is wat ronder bij man iets meer afgeplat. Jonge vogels zijn overwegend groen met een oranje snavel welke na vier maanden uitkleur naar zwartbruin. Na 1 jaar komen ze op kleur en mannen krijgen dan de rode snavel terug.

Er zijn nog geen mutanten bekend.

Verder gelijk aan overige Edelparkieten.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Malabar parkiet**

De Malabar is ook nog vrij zeldzaam op een tentoonstelling,hoewel hij meer wordt gehouden,dan de Layard's.

Een goede conditie is een eerste vereiste,ook moet het model goed vol zijn en de ruglijn vanaf de nekband een rechte lijn naar de punt van de staart. De kleur van de kop is dieper blauwgrijs dan de borst en mantel,deze kleur moet wel zo egaal mogelijk zijn. In de blauwe slagpennen is iets groen op de buitenvlag zichtbaar,ook in de staart zien we groen aan de buiten zijde. De nekband is ongeveer 3 mm breed en moet strak zijn zonder uitlopers,ook de lichtzeegroene band eronder moet strak zijn afgelijnd. Om elk veertje op het vleugeldek zit een smalle geelgroene omzoming,dit moet een scherpe schubtekening vormen op het vleugeldek. De pop heeft een bredere nekband welke ook strak dient te zijn. De onderzijde hier is grijs. Het groen bij het oog is vager dan bij de man. De borstkleur moet vanaf de hals tot en met de buik egaal grijsgroen zijn. De schubtekening op de vleugels moet aan de zelfde eisen voldoen als bij de man. De pop heeft een geheel zwarte snavel.

Zover bekend zijn er nog geen mutaties .

Verder gelijk aan overige Edelparkieten.

#### 4f: Langstaart parkieten en de Derbyan parkiet

##### Algemeen:

Langstaart parkieten zijn de moeilijkste soorten binnen de *Psittacula* familie. Naast de nominaatvorm zijn er nog vier ondersoorten bekend. Deze ondersoorten zijn nog niet in deze standaard opgenomen, voor zover ons bekend komen ze niet in Europa voor, wel hebben we een korte omschrijving bij algemeen gedaan. Er is duidelijk geslacht's verschil bij langstaart parkieten, poppen hebben een zwarte snavel, een groene nekkleur, minder rood aan kop, een donkergroene baard tekening en de staart is veel korter.

##### **Malakka langstaart parkiet (*Psittacula longicauda longicauda*) Boddaert 1783**

Verspreidingsgebied Borneo, Sumatra, Maleisie, Singapore en Malakka.  
 Formaat; man 42 cm pop 37 cm  
 Ringmaat : 6 mm

##### Niet beschreven ondersoorten:

##### **Roodkop langstaart parkiet (*Psittacula longicauda modesta*) Fraser 1845**

Verspreidingsgebied het eiland Enggano in Indonesie.  
 Deze ondersoort verschilt met de nominaatvorm voornamelijk in formaat 48 cm bij man, maar de staart is wel veel korter. Vooral het lichaam zelf is veel forser. De gehele kop is diep rozerood van kleur inclusief de schedel met op het voorhoofd een groene waas en een duidelijke teugelstreep. De wangen zijn diep rood en de achterkop is roodbruin met groene waas. Poppen van deze ondersoort verschillen voornamelijk in formaat 43 cm en kopkleur, de achterkant van de kop heeft een roodbruine kleur met groene waas, verder gelijk aan nominaatvorm.

##### **Nicobar langstaart parkiet (*Psittacula longicauda nicobarica*) Gould 1857**

Verspreidingsgebied de Nicobar eilanden groep.  
 Het verschil met de nominaatvorm is voornamelijk de grootte, de Nicobar is 48 cm, waarbij de staart van de man de helft van de totale lengte voor zijn rekening neemt. De kop van deze ondersoort heeft diep rode wangen en een groengele achterkop en nek. De kop toont een blauwe waas. De onderrug is groenachtig van kleur. Poppen verschillen met de nominaatvorm door hun diep rood gekleurde wangen.

##### **Andamen langstaart parkiet (*Psittacula longicauda tytleri*) Hume 1874**

Deze ondersoort komt voor op de Andamen eilanden. De Andamen langstaart parkiet verschilt met de nominaatvorm voornamelijk in grootte (44 cm) en kleur rondom de kop. Het achterhoofd, de wangen en het rugdek zijn geelgroen met een grijze waas. De keel, borst en buik hebben een blauwe waas. Poppen hebben een dof orangerode wangtekening.

##### **Natuna langstaart parkiet (*Psittacula longicauda defontainei*) Chasen 1934**

Verspreidingsgebied Natuna, Riau, Bintan, Belitung en Karimata.  
 Lijkt erg veel op de nominaatvorm ook het formaat is hetzelfde (42 cm), de weinige verschillen zijn enkel dat de wangen iets dieper van kleur zijn met een oranje –rode waas en de kop is iets geler. Poppen hebben een iets dieper rode wangkleur dan de nominaatvorm.

##### **Fysieke standaard: Langstaart parkieten**

Gelijk aan baard parkieten, alleen de kop en snavel zijn wat kleiner /smaller, ook steek de bovensnavel wat meer naar voren. De punt hiervan blijft ongeveer 1 cm vanaf de keel verwijderd. Het model lijkt wat smaller / ieler dit komt door de lange staart van de man. De bovenschedel is ook iets meer afgeplat.

##### **Derbyan parkiet (*Psittacula derbyana*) Fraser 1852**

##### Algemeen :

Behoort tot de grootste soorten binnen de *Psittacula* familie, vooral zijn forse lichaam is opvallend, ook de paarse borst en buikkleur zijn specifieke kenmerken.  
 Het verspreidingsgebied is Zuidoost Azië, vanaf Noordoost Assam door Zuidoost Tibet tot Zuidwest China en de provincies Swechwan en Yunnan.  
 Er zijn geen ondersoorten, wel kunnen we stellen dat de Derbyan op de borst/buikkleur na erg veel op de baard parkieten gelijk. De poppen tonen ook de lichte streep in de nek en ook de geelgroene vleugelbalk bezitten beide soorten.  
 Formaat : 50 cm, pop 48 cm  
 Ringmaat: 8 mm

##### **Fysieke standaard: Derbyan parkiet**

Is gelijk aan fysieke standaard van de baard parkieten, alleen het model is forser inclusief de snavel.

Kleurslag	Man: Malakka langstaart parkiet	Pop: Malakka langstaart parkiet	Man: Derbyan parkiet	Pop: Derbyan parkiet
<b>Kleur:</b> <b>Formaat:</b>	<b>Groen</b> <b>42 cm</b>	<b>groen</b> <b>37 cm</b>	<b>groen</b> <b>50 cm</b>	<b>groen</b> <b>48 cm</b>
Kop	Dieproze,boven schedel donkergroen Lichtgeelgroen	Heldergroen, iets blauwe waas op achter wangen Groen	Grijs met paarse waas,voorhoofd meer blauw Heldergroen	Kobalt/violetachtig, Voorhoofd helderder blauw Heldergroen
Nek				
Hals en borst Buik en onderlijf	Lichtgroen Lichtgroen met gele waas	Diep heldergroen Lichtgroen	Diep paars Paars,onderlijf en dijen groen	Gelijk aan man,iets doffer
Mantel/rugdek Stuit	Lichtgeelgroen met iets blauwe waas Egaal lichtgroen	Groen ,iets bewaasd lichtgroen	Donkergroen met lichte waas Egaal groen	Gelijk aan man
Hand - en armpennen	Groen met zwartgrijze toppen,buitenvlag groen,binnenvlag zwartgrijs	Gelijk aan man	Donkergroen,met grijszwarte toppen	Gelijk aan man
Vleugel dekveren	Diepgroen,met geelgroene waas	Gelijk aan man,iets meer bruine waas	Donkergroen	Gelijk aan man
Middelste staartpennen	Violet	Gelijk aan man	Donkergroen, overgaand in diepblauw,toppen weer groen	Gelijk aan man
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Diepblauw met groene buitenvlag Geelgroen	Gelijk aan man	Diepgroen,onderzijde grijs. Groen	Gelijk aan man
Bovenstaart dekveren	Lichtgroen	Lichtgroen	Groen	Groen
Snavel	Rood,iets lichte punt,ondersnavel zwart	Zwart	Dieprood met gele punt,ondersnavel zwart.	Zwart
Snavelrand/Neusdop	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	
Poten	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Grijs	Grijs
Nagels	Grijs	Grijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Ogen	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris	Zwart met bleke iris
<b>Tekening:</b>				
Keel/baard	Zwart	Donkergroen	Zwart	Zwart
Oogstreep/masker	n.v.t.	Dieproze	n.v.t.	n.v.t.
Voorhoofdsband	Blauwzwart	Blauwzwart	Zwart	Zwart
Halsband (pop)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Lichtroze
Kop/nek	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd
Schoudervlek	n.v.t.	n.v.t.	Geelgroen	Geelgroen
Vleugelpennen	Licht geelgroen omzoomd	Gelijk aan man	Bleekgele omzoming	Gelijk aan man

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Malakka langstaart parkiet:**

Langstaart parkieten komen het best tot zijn recht als ze in een ruime TT kooi geplaatst zijn ,beter is nog een vlucht. Dit is om de staart niet te beschadigen,als ze in een TT kooi zitten waarbij de punt van de staart de bodem raakt of zijkant,dan hier een opmerking bij plaatsen dat vogel beter tot zijn recht komt in grotere kooi. Indien niet beschadigd ,niet straffen uiteraard. Een goede conditie is een eerste vereiste. De kleur moet helder en egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven.

De baard is vrij smal en loopt door tot halfweg de kop,bij de man is het zwart en bij de pop donkergroen. Zowel de baard als de schedel moeten strak afgelijnd zijn. Poppen hebben alleen een rood masker tussen de baard en halfweg het oog en een rood vlekje achter het oog,verder is de kop heldergroen,op de donkergroene voorhoofdsband na dan.

Jonge vogels zijn donkerder groen en lijken veel op de pop het masker is wel lichter van kleur. De snavel bij jongen is zwart en jonge mannen tonen al een blauwe waas op het rugdek.

Er zijn al mutaties ontstaan,maar hier zijn nog te weinig gegevens over bekend om ze nu al in deze standaard te doen opnemen .Wat al wel is ontstaan zijn de waarschijnlijk donkergroen ( D factor) en de aqua of turquoise Verder gelijk aan overige Edelparkieten.

**KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Derbyan parkiet:**

De Derbyan parkiet is een robuuste forse vogel, smalle en iele vogels moeten bestraft worden bij model.De borstkleur moet zo diep mogelijk paars zijn ,de buik is een tint lichter,bij zowel man als pop.Verder moet de kleur zo egaal mogelijk zijn ,de mantel/rugdek is vooral bij de man wat bewaasd,de nek is helder groen. De vleugelbalk is iets minder strak dan bij de baard parkieten,wel geniet de strakst afgelijnde de voorkeur. Poppen hebben buiten de zwarte snavel ook een blauwere kop en een lichtroze halsband. Aan de onderzijde van de baard zien we een kleine inkeping.

Verder gelijk aan overige Edelparkieten.

Er is een mutant ontstaan, waarschijnlijk een gezoomde, maar hier moeten eerst meer gegevens over zijn, om deze in de standaard te doen opnemen.